

A 1a. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę we wskazaniach pozarejestacyjnych

lp.	Substancja czynna	Nazwa, postać i dawka leku	Zawartość opakowania	Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN	Termin wejścia w życie decyzji	Okres obowiązywania decyzji	Grupa limitowa	Urządowa cena zbytu	Cena detaliczna	Wysokość limitu finansowania	Zakres wskazań objętych refundacją	Zakres wskazań pozarejestacyjnych objętych refundacją	Poziom odpłatności	Wysokość dopłaty wliczonej w biorcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Acebutololum	Sectral 200, tabl. powł., 200 mg	30 tabl.	5909990109920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,36	10,54	5,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,33
2	Acebutololum	Sectral 400, tabl. powł., 400 mg	30 tabl.	5909990110018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,74	19,72	10,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,10
3	Aciclovirum	Hascovir, tabl., 800 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909990835782	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	32,40	43,33	43,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	21,67
4	Aciclovirum	Hascovir, tabl., 200 mg	30 tabl. (2 blist. po 15 szt.)	5909991049515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	9,90	14,17	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytarnej; Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	7,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Aciclovirum	Hascovir, tabl. , 400 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991052218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	16,76	23,55	23,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	11,78
6	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840014	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	12,10	16,53	12,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	10,25
7	Aciclovirum	Heviran, tabl. powl., 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	21,60	28,73	25,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	16,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Aciclovirum	Heviran, tabl. powł., 800 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990840229	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego	38,88	50,26	50,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej.Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów	50%	25,13
9	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990109210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,97	1,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	1,97
10	Acidum folicum	Acidum Folicum Richter, tabl. , 15 mg	30 tabl.	5909990109319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,00	2,99	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	2,99
11	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	1,57	1,97	1,00	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	1,97
12	Acidum folicum	Folacid , tabl. , 15 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990960910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy	2,01	3,00	2,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi; Łuszczycza leczona metotreksatem	ryczałt	3,00
13	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 360 mg	120 tabl.	5909990219209	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	821,66	912,64	889,13	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	26,71
14	Acidum mycophenolicum	Myfortic, tabl. , 180 mg	120 tabl.	5909990219797	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	397,87	448,70	444,56	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Allopurinolum	Allupol, tabl. , 100 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990109418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5,00	7,75	7,75	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
16	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 100 mg	50 tabl.	5909990163212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
17	Allopurinolum	Milurit, tabl. , 300 mg	30 tabl.	5909990414819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol	10,80	15,35	15,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu	ryczałt	3,20
18	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid, tabl. , 5+50 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990206025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,59	9,17	9,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	2,75
19	Amiloridum + Hydrochlorothiazidum	Tialorid mite, tabl. , 2,5+25 mg	50 tabl. (poj.plast.w pudeł.)	5909990373819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,19	7,34	6,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia; Moczówka nerkopochodna	30%	3,04
20	Amiodaronum	Opacorden, tabl. powł., 200 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990086818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	31.0, Leki przeciwaritmiczne klasy III - amiodaron	14,69	20,37	20,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, cz stoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
21	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powł., 25 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991048914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	7,02	8,49	3,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	6,29
22	Amitriptilinum	Amitryptilinum VP, tabl. powł., 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909991049010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe	3,89	4,55	1,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Neuralgie, ból neuropatyczny	30%	3,67
23	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,64
24	Amlodipinum	Adipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990642311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,51	8,21	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	Amlodipinum	Agen 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991099022	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,10	16,87	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,64
26	Amlodipinum	Agen 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991098926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,68	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,06
27	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008635	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,10	10,99	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,37
28	Amlodipinum	Aldan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991008734	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,88	17,71	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	6,48
29	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057399	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,91	13,45	13,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,04
30	Amlodipinum	Amlodipine Arrow 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990057351	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,64	7,27	7,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,18
31	Amlodipinum	Amlodipine Teva, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721580	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,97	7,64	7,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,29
32	Amlodipinum	Amlodipine Teva, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990721603	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 5 mg	30 tabl.	5909990842476	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,08	7,76	7,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,33
34	Amlodipinum	Amlomyl, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990842698	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,64
35	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 5 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,18	7,86	7,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,36
36	Amlodipinum	Amlonor, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990642625	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	10,80	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,64
37	Amlodipinum	Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048977	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	15,12	20,10	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	8,87
38	Amlodipinum	Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990048939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	8,64	11,56	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,94
39	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,96	16,18	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,56
40	Amlodipinum	Amlozek, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990799817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	17,82	23,00	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	11,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	Amlodipinum	Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,80	16,55	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,32
42	Amlodipinum	Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990565986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,56	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,94
43	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	4,95	6,52	4,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,71
44	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,94	12,96	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	7,34
45	Amlodipinum	Cardilopin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990907519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,46	21,54	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,31
46	Amlodipinum	Finamlox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990794461	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,23	15,95	15,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,79
47	Amlodipinum	Lofral 10, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636075	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	12,54	17,35	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Amlodipinum	Lofral 5, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990636068	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,94	8,68	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,06
49	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990993017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	6,24	9,00	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	3,38
50	Amlodipinum	Normodipine, tabl. , 10 mg	30 tabl.	5909990993116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,05	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	4,82
51	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	90 tabl.	5909990421824	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	26,46	33,44	24,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	16,58
52	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	9,18	12,13	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	6,51
53	Amlodipinum	Tenox, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990963119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	16,74	21,83	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	10,60
54	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990621217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,83	8,56	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	Amlodipinum	Vilpin, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991042912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,99	16,76	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	30%	5,53
56	Aprepitantum	Emend, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg	3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g)	5909990007387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant	210,60	243,48	243,48	Wczesne albo opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka	Wczesne lub opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka	ryczałt	3,20
57	Atenololum	Atenolol Sanofi 25, tabl. , 25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990370610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,40	4,66	4,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
58	Atenololum	Atenolol Sanofi 50, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990011414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	2,15	4,39	4,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
59	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787586	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,13	11,36	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,12
60	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787609	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,28	21,79	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,32
61	Atorvastatinum	Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,54	41,62	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,67
62	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990792290	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	9,01	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,77
63	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990792573	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,88	17,08	17,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,12
64	Atorvastatinum	Atorgamma, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990792887	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	23,76	32,22	32,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,67
65	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990336647	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	38,08	26,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
66	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990419173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	45,36	57,33	53,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	19,92
67	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990623464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	38,58	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,63
68	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	14,78	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,54
69	Atorvastatinum	Atoris, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990991914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,13	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,66
70	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,18	14,61	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,37
71	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990077939	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	23,44	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,97
72	Atorvastatinum	Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	35,64	44,93	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	19,98
73	Atorvastatinum	ATORVOX, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	32,18	41,23	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,28
74	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573400	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,04	13,39	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,15
75	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990573530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,29	20,73	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,26
76	Atorvastatinum	Atorvox, tabl. powl., 80 mg	30 tabl.	5909990849390	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	67,61	82,57	71,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	32,68
77	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078141	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,75	12,01	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,77
78	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078264	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,66	21,13	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	Atorvastatinum	Atractin, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (blist.)	5909990078356	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	38,58	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,63
80	Atorvastatinum	Atrox 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,64	11,90	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,66
81	Atorvastatinum	Atrox 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,42	21,94	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,47
82	Atorvastatinum	Atrox 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991124816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,24	39,16	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	14,21
83	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991150914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	14,21	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,97
84	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,23	22,80	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,33
85	Atorvastatinum	Corator, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991151119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,27	40,26	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,31
86	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 10 mg	30 tabl.	5909990905508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,33	8,35	8,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,51
87	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 20 mg	30 tabl.	5909990905638	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,75	15,87	15,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,76
88	Atorvastatinum	Lambrinex, tabl. powl., 40 mg	30 tabl.	5909990905782	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,55	29,86	29,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,96
89	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,47	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,23
90	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	21,70	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,23
91	Atorvastatinum	Larus, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	37,80	47,25	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	22,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755547	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,62	8,66	8,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,60
93	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	44,93	58,31	58,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	17,49
94	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	16,39	16,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,92
95	Atorvastatinum	Storvas, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990755578	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	30,83	30,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,25
96	Atorvastatinum	Torvacard 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338290	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,42	15,95	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,71
97	Atorvastatinum	Torvacard 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	20,54	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,07
98	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338436	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,70	38,58	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,63
99	Atorvastatinum	Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990338443	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	80,83	99,29	99,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	29,79
100	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,80	14,21	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,97
101	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,74	19,07	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,60
102	Atorvastatinum	Torvalipin, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990053278	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	29,21	38,05	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,10
103	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,67	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,43
104	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powł., 0,01 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	28,08	34,41	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,01 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	42,12	50,79	26,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	32,08
106	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990998913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,36	24,01	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,54
107	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990998920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	36,72	46,09	35,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	21,14
108	Atorvastatinum	Tulip, tabl. powl., 0,02 g	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990998937	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	57,24	70,05	53,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	32,64
109	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078448	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,78	13,12	8,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,88
110	Atorvastatinum	Xavitor, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990078622	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA	18,61	24,28	17,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,81
111	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	50 tabl.	5909990232819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	22,68	30,41	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
112	Azathioprinum	Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990232826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	17,28	22,90	18,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	7,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 25 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990144211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	31,21	39,53	30,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	12,32
114	Azathioprinum	Imuran, tabl. powl., 50 mg	100 tabl. (4 blist.po 25 szt.)	5909990277810	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna	50,22	63,09	60,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	5,83
115	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	18,38	3,57	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	18,01
116	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990118915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,76	25,36	7,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	22,20
117	Benazeprilum	Lotensin, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990119011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,76	34,37	14,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	28,06
118	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem)	5909990335169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	23,06
119	Budesonidum	Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.)	5909990335176	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	25,09
120	Budesonidum	Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg	100 kaps.	5909990430314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid	246,24	282,56	282,56	Choroba Le niowskiego-Crohna	Choroba Le niowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku ycia; Posta jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi	ryczałt	3,56
121	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	19,19	25,54	21,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	10,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	Budesonidum	Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg	60 kaps. (+ inh.)	5909990926312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,78	42,83	42,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	12,85
123	Budesonidum	Neplit Easyhaler 100, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	42,12	51,95	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	26,97
124	Budesonidum	Neplit Easyhaler 200, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (zest. startowy)	5909990337323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	63,72	78,53	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	28,56
125	Budesonidum	Neplit Easyhaler 400, Budesonide Easyhaler, proszek do inhalacji, 400 mcg	1 poj.a 100 daw. (zest. startowy)	5909990337286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	51,84	65,81	65,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	19,74
126	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach	72,34	89,64	89,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	ryczałt	3,20
127	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach	72,90	88,28	68,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	ryczałt	23,42
128	Budesonidum	Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml	20 poj.a 2 ml	5909990445813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach	94,85	113,85	90,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	50,19
129	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 200 daw.	5909990677313	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	35,89	45,29	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	20,31
130	Budesonidum	Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn	1 poj.a 100 daw.	5909990677412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	32,25	41,39	35,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	16,41
131	Budesonidum	Ribupspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z ustnik.)	5909990335183	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	58,58	73,03	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	23,06
132	Budesonidum	Ribupspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg	1 poj. (z komor inhal.)	5909990335190	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	60,48	75,06	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	25,09
133	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer)	5909991033224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	64,26	79,11	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	29,14
134	Budesonidum	Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg	1 poj.a 200 daw.	5909991033248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole	61,02	75,63	71,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wirusowe zapalenie krtani u dzieci	30%	25,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	14 tabl. (blis.)	5909990430017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,17	24,90	7,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	19,45
136	Candesartanum	Atacand, tabl. , 8 mg	28 tabl. (blis.)	5909990430024	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,15	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	36,27
137	Candesartanum	Atacand, tabl. , 16 mg	28 tabl. (2 blis. po 14 szt.)	5909990430123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,24	49,07	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	27,30
138	Candesartanum	Karbis, tabl. , 8 mg	28 tabl.	5909990772162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	26,95	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,07
139	Candesartanum	Karbis, tabl. , 16 mg	28 tabl.	5909990772193	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	29,16	37,21	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	15,44
140	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990495238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	2,53	3,55	2,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,55
141	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990495337	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,97	7,01	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,47
142	Captoprilum	Captopril Polfarmex, tabl. , 12,5 mg	30 tabl. (3 blis. po 10 szt.)	5909990830817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	1,87	2,42	1,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	2,42
143	Carbamazepinum	Amizepin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blis. po 10 szt.)	5909990043910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	14,59	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne niż okoliczne w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	Carbamazepinum	Finlepsin, tabl. , 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,76
145	Carbamazepinum	Finlepsin 200 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991030315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	10,35	14,10	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,76
146	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991014216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,80	16,15	12,64	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	6,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	Carbamazepinum	Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909991014223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	20,43	26,74	21,07	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,87
148	Carbamazepinum	Neurotop retard 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	17,90	15,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	5,29
149	Carbamazepinum	Neurotop retard 600, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 600 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990244614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	23,65	31,61	31,61	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	3,20
150	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	100 ml	5909990341917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	6,83	9,83	8,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	4,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	Carbamazepinum	Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml	250 ml	5909990341924	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne	15,76	21,73	21,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznanem nowotworu	ryczałt	3,20
152	Carbamazepinum	Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg	50 tabl.	5909990120215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	15,86	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznanem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	8,52
153	Carbamazepinum	Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg	30 tabl.	5909990120116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	12,12	16,50	12,64	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznanem nowotworu; Neuralgie inne ni okre lone w charakterystyce produktu leczniczego, ból neuropatyczny w tym ból fantomowy	ryczałt	7,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Carbamazepinum	Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990751013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,64	7,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	6,94
155	Carbamazepinum	Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990751211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	13,18	18,14	15,81	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	5,53
156	Carbamazepinum	Timonil 600 retard, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990751310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,27	32,27	31,61	Padaczka	Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu	ryczałt	3,86
157	Carbocisteinum	Mukolina, syrop, 50 mg/ml	120 ml	5909990032211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina	4,42	6,62	6,62	Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rz sek	Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,99
158	Carvedilolum	Atram 6,25, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990570454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,81	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,55
159	Carvedilolum	Avedol, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074051	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,81	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,55
160	Carvedilolum	Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990419685	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,34	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	Carvedilolum	Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990338788	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,37	7,34	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,08
162	Carvedilolum	Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990727100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,43	7,41	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,15
163	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 3,125 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	8,31	9,15	0,90	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,52
164	Carvedilolum	Carvetrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909991016913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	9,34	10,52	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,26
165	Carvedilolum	Coryol , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (blist.)	5909990983315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,54	17,16	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,90
166	Carvedilolum	Coryol 3,125, tabl. , 3,125 mg	30 tabl.	5909990216604	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	11,80	12,89	0,90	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,26
167	Carvedilolum	Dilatrend, tabl. , 6,25 mg	30 tabl.	5909990716111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,82	17,46	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,20
168	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl.	5909990048465	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,85	7,86	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,60
169	Carvedilolum	Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg	100 tabl.	5909990048472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	22,81	26,17	6,01	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,96
170	Carvedilolum	Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990074792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,80	7,81	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,55
171	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990687886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	15,03	16,61	1,80	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,35
172	Carvedilolum	Vivacor , tabl. , 6,25 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990687893	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	30,07	33,23	3,61	Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV	Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia	30%	30,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Cetirizinum	Alarmed, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990910793	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,61
174	Cetirizinum	Alarmed, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991075224	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,24	10,56	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,39
175	Cetirizinum	Allertec, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990569441	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,61
176	Cetirizinum	Allertec, syrop, 5 mg/5 ml	1 but.a 100 ml	5909990851119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	10,08	13,45	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,88
177	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	10 ml w but. z kroplomierzem	5909991103811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	6,84	9,98	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,41
178	Cetirizinum	Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml	20 ml w but. z kroplomierzem	5909991103835	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	12,14	17,37	17,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,21
179	Cetirizinum	Amertil, roztwór doustny, 1 mg/ml	200 ml (but.)	5909990215393	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	16,20	21,71	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	8,56
180	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990410729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,48	9,74	9,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
181	Cetirizinum	Amertil, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990410736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,80	15,37	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,61
182	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	75 ml	5909990857012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	7,99	10,67	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,74
183	Cetirizinum	CetAlergin, syrop, 1 mg/ml	150 ml	5909990857029	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	14,90	19,60	14,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	9,74
184	Cetirizinum	CetAlergin, krople, 10 mg/ml	10 ml	5909990857111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	8,21	11,44	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,87
185	Cetirizinum	CetAlergin, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990872626	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,78	11,13	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,96
186	Cetirizinum	Cetigran, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990044559	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	14,06	14,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,22
187	Cetirizinum	Letizen, tabl. powł., 10 mg	20 tabl.	5909990869725	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	7,37	10,70	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	3,53
188	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powł., 10 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990184620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	10,42	13,96	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	Cetirizinum	Zyrtec, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990184637	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,39
190	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	10 ml	5909990184712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	7,50	10,70	9,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,13
191	Cetirizinum	Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml	20 ml	5909990184736	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	13,46	18,78	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,63
192	Cetirizinum	Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml	75 ml	5909990781515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	9,16	11,92	7,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńoruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	6,99
193	Chloroquinum	Arechin, tabl. , 250 mg	30 tabl.	5909990061914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina	14,58	20,21	20,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne; Porfiria skórna pó na	30%	6,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
194	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 25 mg	50 kaps.	5909990787289	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,08	74,27	72,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	4,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 50 mg	50 kaps.	5909990787357	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	120,96	144,47	144,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Ciclosporinum	Cyclaid, kaps. mi kkie, 100 mg	50 kaps.	5909990787463	2012-05-01 – dla kolumny 12 , 2012-05-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	254,34	291,18	291,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946426	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	59,10	74,29	72,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	4,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946525	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	122,36	145,97	145,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
199	Ciclosporinum	Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps. (5 blist.po 10 szt.)	5909990946624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	255,04	291,94	291,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytozowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	Ciclosporinum	Equoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990946716	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01/2012-07- 01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	277,61	316,97	316,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci oporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy lite u pacjentów do 18 r. .	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg	50 kaps.	5909990336616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	104,72	123,10	72,99	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości szpikowej, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	53,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg	50 kaps.	5909990336715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	172,37	199,49	145,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	56,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg	50 kaps.	5909990336814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	343,44	386,53	291,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości szpikowej, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	97,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, roztwór doustny , 100 mg/ml	50 ml	5909990336913	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne	398,08	445,88	316,97	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kości szpikowej, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	132,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Ciclosporinum	Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg	60 kaps.	5909990406111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne	50,38	61,13	35,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytozowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek; 12. Guzy łagodne u pacjentów do 18 r.	ryczałt	29,30
206	Ciprofloxacinum	Ciphin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990499113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,99	10,88	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,85
207	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl.	5909990066216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	13,50	16,78	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	12,75
208	Ciprofloxacinum	Ciprinol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl.	5909990066414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	8,64	10,46	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	8,44
209	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	9,31	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,29
210	Ciprofloxacinum	Cipronex, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909990334964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,95	10,84	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	6,81
211	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909990308712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,83	9,60	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią	50%	7,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	Ciprofloxacinum	Cipropol, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (2 blist.po 5 szt.)	5909990729012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	11,34	14,46	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	10,43
213	Ciprofloxacinum	Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg	10 tabl.	5909990338030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	7,56	10,42	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	6,39
214	Ciprofloxacinum	Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	5,29	6,88	4,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	4,86
215	Ciprofloxacinum	Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg	10 tabl. (blist.)	5909991033613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego	9,18	12,15	8,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni	50%	8,12
216	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	8,10	11,77	11,77	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	3,20
217	Clonazepamum	Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990135615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny	4,10	5,25	2,94	Padaczka	Padaczka u dzieci do 1 roku ycia	ryczałt	5,25
218	Colecalciferolum (vit. D3)	Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml	10 ml	5909990260218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	2,92	4,37	4,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,20
219	Colecalciferolum (vit. D3)	Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml	10 ml	5909991047818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,05	5,99	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,36
220	Colecalciferolum (vit. D3)	Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml	10 ml (but.)	5909990178513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol	4,01	5,95	5,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi	ryczałt	3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	Cyclophosphamidum	Endoxan, dra etki, 50 mg	50 dra .	5909990240814	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkiluj ce - cyklofosfamid	72,36	89,67	89,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza; Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowo ci i anemie hemolityczne odporne na leczenie sterydami; Zespół POEMS	ryczałt	3,20
222	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776412	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	44,38	56,82	53,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	6,43
223	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990776511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	92,01	111,79	107,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	7,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	Dalteparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. (anty-Xa)/ml	10 amp.a 1 ml	5909990776610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	175,13	204,72	204,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	4,27
225	Dalteparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml	10 amp.a 4 ml	5909990776719	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	175,13	204,72	204,72	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	4,27
226	Dalteparinum natriicum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990949410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	137,89	163,29	160,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	5,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml	5 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990949519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	113,38	135,86	133,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronien nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	5,08
228	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml	5 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990949618	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	137,89	163,29	160,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronien nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	5,72
229	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml	5 amp.-strz z igł po 0,72 ml	5909990949717	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	156,11	183,89	183,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronien nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	3,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	Dalteparinum natricum	Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml	5 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990958818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	82,95	102,10	102,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	3,20
231	Danazolium	Danazol Jelfa, tabl., 200 mg	100 tabl.	5909990282517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,76	123,94	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,73
232	Danazolium	Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg	100 tabl. (fiol.)	5909990925339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol	102,60	123,77	123,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)	ryczałt	3,56
233	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068494	2012-01-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	76,87	94,85	90,30	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	7,75
234	Desmopressinum	Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990068548	2012-01-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny	153,27	180,60	180,60	Moczówka prosta przysadkowa	Choroba von Willebrandta	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 0,5 mg	20 tabl.	5909990170418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	3,73	5,03	3,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przemedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory	ryczałt	4,60
236	Dexamethasonum	Pabi-Dexamethason, tabl. , 1 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990170517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego	4,86	7,25	7,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Przemedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory	ryczałt	3,20
237	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,14	24,79	24,79	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,20
238	Diazepamum	Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg	5 wlew.a 2,5 ml	5909990709311	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,74	21,32	12,40	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	12,12
239	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	16,09	20,62	12,40	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	11,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240	Diazepamum	Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml	5 wlew.a 2,5 ml	5909990751617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki)	18,58	25,26	24,79	Padaczka	Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg	ryczałt	3,67
241	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957811	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	15,34	20,79	19,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	10,91
242	Diclofenacum	Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957828	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,67	10,87	9,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	5,93
243	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990957712	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	8,64	11,91	9,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	6,97
244	Diclofenacum	Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	10 tabl. (blist.)	5909990957729	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,94	5,67	4,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	3,20
245	Diclofenacum	Majamil prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990033614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	3,97	7,64	7,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	3,82
246	Diclofenacum	Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg	20 kaps.	5909990487714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,61	10,81	9,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	5,87
247	Diclofenacum	Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990974122	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,77	16,26	14,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	8,85
248	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	10 tabl. (blist.)	5909990457113	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	6,74	9,88	9,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	4,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
249	Diclofenacum	Olfen Uno, Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990457120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwpalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,28	24,24	24,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Dyskopatie	50%	12,12
250	Diltiazemum	Diltiazem Polfarmex, tabl. , 30 mg	60 tabl. (pojem.)	5909990464722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,05	9,18	5,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,79
251	Diltiazemum	Dilzem, tabl. , 60 mg	100 tabl.	5909990205011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	14,58	19,83	18,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,41
252	Diltiazemum	Dilzem 120 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl.	5909990482917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,52	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,55
253	Diltiazemum	Dilzem 180 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl.	5909990483310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,88	16,67	16,67	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
254	Diltiazemum	Dilzem Retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 90 mg	30 tabl.	5909990213214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,02	9,85	8,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,67
255	Diltiazemum	Oxycardil 120, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990112616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,99	11,52	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,55
256	Diltiazemum	Oxycardil 180, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	11,99	16,79	16,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,23
257	Diltiazemum	Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 240 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990416417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	16,74	22,69	22,34	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
258	Diltiazemum	Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990121120	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem	7,67	11,17	11,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,20
259	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (but.)	5909990029815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas kłodronowy	270,00	308,62	306,54	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
260	Dinatrii clodronas	Bonefos, kaps., 400 mg	100 kaps. (blist.)	5909990029822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas kłodronowy	270,00	308,62	306,54	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
261	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990421879	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas kłodronowy	270,00	308,62	306,54	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
262	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990953523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas kłodronowy	270,00	308,62	306,54	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	5,28
263	Dinatrii clodronas	Sindronat, kaps. twarde, 400 mg	120 kaps.	5909990953530	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas kłodronowy	324,00	367,85	367,85	Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych	Postepuj ce kostniej ce zapalenie mi ni	ryczałt	3,20
264	Donepezilum	Alzdone, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990712847	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	40,64	49,45	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	30,07
265	Donepezilum	Alzdone, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990713097	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	45,62	57,93	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	19,19
266	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724369	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	56,16	66,06	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	46,68
267	Donepezilum	Alzepezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990724383	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	86,49	101,67	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	62,93
268	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990770038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,45	36,41	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	17,03
269	Donepezilum	Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990770045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,66	45,14	45,14	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
270	Donepezilum	Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024413	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	62,28	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	23,54
271	Donepezilum	Cogiton 5, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991024314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	46,41	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	27,03
272	Donepezilum	Cogezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	46,41	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	27,03
273	Donepezilum	Cogezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	62,28	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	23,54
274	Donepezilum	Cogezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798964	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	40,63	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	21,25
275	Donepezilum	Cogezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990799053	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,68	62,28	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	23,54
276	Donepezilum	Donecept, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689781	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	27,11	34,98	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	15,60
277	Donepezilum	Donecept, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990689873	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	43,79	43,79	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,14
278	Donepezilum	DONECTIL, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990683581	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,40	40,63	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	21,25
279	Donepezilum	DONECTIL, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990683666	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	58,32	71,52	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	32,78
280	Donepezilum	Donecil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	30 tabl.	5909990851478	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	31,86	40,30	29,65	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	19,55
281	Donepezilum	Donecil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	30 tabl.	5909990851492	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	63,72	77,63	59,30	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	36,12
282	Donepezilum	Donemed, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990739479	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,08	36,01	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
283	Donepezilum	Donemed, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990739509	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,48	44,95	44,95	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,49
284	Donepezilum	Donepex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909991055912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	37,80	46,41	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	27,03
285	Donepezilum	Donepex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909991056018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	43,20	55,35	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,61
286	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990814077	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	24,84	32,55	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,17
287	Donepezilum	Donepezil Bluefish, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990814138	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	48,60	61,12	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	22,38
288	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990776870	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	28,08	36,01	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,63
289	Donepezilum	Doneprion, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990776900	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	33,48	44,95	44,95	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,49
290	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657353	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	42,12	51,04	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	31,66
291	Donepezilum	Donesyn, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990657360	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	49,14	61,71	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	22,97
292	Donepezilum	Mensapex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698448	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	68,04	78,77	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	59,39
293	Donepezilum	Mensapex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698578	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	81,00	95,79	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	57,05
294	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726929	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	30,24	38,32	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	18,94
295	Donepezilum	Pamigen, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726936	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	32,34	43,73	43,73	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990743940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	60,48	70,68	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	51,30
297	Donepezilum	Pezilgen, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990744008	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	71,28	85,39	55,35	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	46,65
298	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990798933	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	28,45	36,41	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	17,03
299	Donepezilum	Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990798940	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	33,66	45,14	45,14	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,54
300	Donepezilum	Symepezil, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990662104	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	28,05	35,98	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	16,60
301	Donepezilum	Symepezil, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990662203	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	32,40	43,79	43,79	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,14
302	Donepezilum	Yasnal, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,44	55,66	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	36,28
303	Donepezilum	Yasnal, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990993314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	64,80	78,46	55,35	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	39,72
304	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990850075	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	27,00	34,86	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	15,48
305	Donepezilum	Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990850204	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	33,66	45,14	45,14	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego, otepienie w przebiegu choroby Parkinsona	30%	13,54
306	Doxazosinum	Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg	30 tabl.	5909990969517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	18,84	6,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,16
307	Doxazosinum	Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990969616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	18,68	23,60	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308	Doxazosinum	Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990969715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,35	30,64	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	11,92
309	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990431410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,31	27,39	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,67
310	Doxazosinum	Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg	30 tabl.	5909990431519	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	57,24	69,96	53,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	32,52
311	Doxazosinum	Doxagen, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990037957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,25	27,33	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,61
312	Doxazosinum	Doxalong, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl.	5909990790951	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,09	27,17	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,45
313	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	27,74	6,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,06
314	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	28,08	33,65	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	24,29
315	Doxazosinum	Doxanorm, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990854516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	32,40	40,33	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	21,61
316	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990484911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,37	23,89	6,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,21
317	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485017	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	23,98	29,27	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,91
318	Doxazosinum	Doxar, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990485116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	26,24	33,74	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
319	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	13,93	18,52	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,16
320	Doxazosinum	Doxonex, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991149710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,86	35,47	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,75
321	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 2 mg	30 tabl.	5909990491315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,00	32,50	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,14
322	Doxazosinum	Kamiren, tabl. , 4 mg	30 tabl.	5909990491414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,32	34,89	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,17
323	Doxazosinum	Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990022571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,70	35,30	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,58
324	Doxazosinum	Prostatic 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	9,72	12,48	6,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,80
325	Doxazosinum	Prostatic 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	15,66	20,37	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	11,01
326	Doxazosinum	Prostatic 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990905614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	27,43	35,02	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	16,30
327	Doxazosinum	Zoxon 1, tabl. , 1 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990903320	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	20,52	24,04	6,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,36
328	Doxazosinum	Zoxon 2, tabl. , 2 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	19,98	24,99	13,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
329	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990080267	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	62,64	77,85	77,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,36
330	Doxazosinum	Zoxon 4, tabl. , 4 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990903511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne	24,30	31,66	26,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,94
331	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014934	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,91	3,95	2,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,95
332	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990014958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	5,31	7,37	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,83
333	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990015030	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	4,26	6,25	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,71
334	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990015054	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	8,37	11,99	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,92
335	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990020829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,58	20,47	20,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	12,80
336	Enalaprilum	Enarenal, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990020836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,88	11,47	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
337	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	2,54	3,56	2,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
338	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990374243	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	7,29	10,83	10,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,40
339	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 5 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422364	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one	4,62	6,62	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
340	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 20 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,63	18,38	18,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
341	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990422388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,08	10,61	10,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
342	Enalaprilum	Mapryl, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990440535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,94	5,91	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,37
343	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,2 ml	5909990048328	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	47,97	60,67	53,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowego - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	10,28
344	Enoxaparinum natricum	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990048427	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	96,41	116,50	107,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowego - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	12,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
345	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990774821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	135,53	160,77	160,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	3,20
346	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990774920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	265,39	302,52	267,95	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	39,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
347	Enoxaparinum natrium	Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990775026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22,0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	175,12	204,71	204,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	4,27
348	Enoxaparinum natrium	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990891429	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22,0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	292,08	332,28	321,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	17,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
349	Enoxaparinum natricum	Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa, 150 mg/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990891528	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych	345,84	391,62	391,62	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronnie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	8,00
350	Estradiolum + Dydrogesteronum	Femoston conti, tabl. powł., 1+5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990973316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawierające estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami	21,59	26,67	13,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Hipogonadyzm hipergonadotropowy i hipogonadotropowy u dziewcząt do 18 r. - terapia substytucyjna	30%	16,92
351	Ethosuximidum	Petinimid, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990244911	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid	31,72	41,54	41,54	Padaczka	Padaczka z napadami nie wiadomo ci dla dzieci do 3 roku życia	ryczałt	3,20
352	Everolimusum	Certican, tabl., 0,5 mg	60 tabl.	5909990211357	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	853,20	948,25	948,25	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	ryczałt	3,20
353	Everolimusum	Certican, tabl., 0,25 mg	60 tabl.	5909990211654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	426,58	480,35	474,13	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko szpiku, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	9,42
354	Everolimusum	Certican, tabl., 0,75 mg	60 tabl.	5909990211845	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus	1 280,03	1 415,25	1 415,25	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko szpiku, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
355	Fenoterolum + Ipratropii bromidum	Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml	20 ml (but.)	5909990101917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	15,66	20,29	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rzęsek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	10,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
356	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml	5 fioł.a 1 ml	5909990312214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	607,50	680,49	680,49	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
357	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	121,50	145,69	145,69	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
358	Filgrastimum	Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 960 mcg/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990830619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	194,40	226,25	226,25	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
359	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczając igł	5909990739387	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	130,13	154,93	154,93	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
360	Filgrastimum	Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml	1 amp.-strz z osłon zabezpieczającą igłę	5909990739448	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	214,79	248,08	248,08	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
361	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687763	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	127,44	152,04	152,04	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
362	Filgrastimum	Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln j/ml	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909990687800	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	215,27	248,59	248,08	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,71
363	Fluconazolom	Flucocast, kaps., 50 mg	7 kaps.	5909990490516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	10,58	14,86	12,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakazę grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
364	Fluconazolom	Flucofast, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990490523	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,60	28,68	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,32
365	Fluconazolom	Flucofast, kaps., 150 mg	1 kaps.	5909990490615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	6,38	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,73
366	Fluconazolom	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	7 kaps. (blist.)	5909990662371	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	22,14	29,26	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,90
367	Fluconazolom	Flucofast, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990662388	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	110,81	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	61,36
368	Fluconazolom	Fluconazin, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909991097219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,39	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
369	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	1 tabl. (blis.)	5909990017874	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	3,87	5,89	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	3,24
370	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg	3 tabl. (blis.)	5909990017881	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,62	16,56	15,89	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,62
371	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg	28 tabl.	5909990780181	2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	73,44	91,17	91,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	45,59
372	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml	150 ml (but.)	5909990859511	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,39	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,86
373	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg	14 tabl. (2 blis.po 7 szt.)	5909990859610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	21,98	29,09	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
374	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859672	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,18	13,36	12,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,18
375	Fluconazolom	Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg	7 tabl. (blist.)	5909990859719	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,47
376	Fluconazolom	Flucorta, syrop, 50 mg/10 ml	150 ml	5909990773862	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	25,14	33,39	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,86
377	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 50 mg	14 kaps.	5909990356010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	24,08	31,33	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,97
378	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 100 mg	7 kaps.	5909990356119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	26,67	34,11	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	21,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
379	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990356126	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	80,72	98,95	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	49,50
380	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 50 mg	7 kaps. (blist.)	5909990652273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,56	13,77	12,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,59
381	Fluconazolom	Flumycon, syrop, 5 mg/ml	150 ml	5909990841707	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	33,07	33,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	16,54
382	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 150 mg	1 kaps. (blist.)	5909991034115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	4,58	6,66	5,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	4,01
383	Fluconazolom	Flumycon, kaps., 200 mg	7 kaps.	5909991034214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	38,20	49,45	49,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	24,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
384	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 100 mg	7 kaps. (blist.)	5909990642533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	23,61	30,83	24,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	18,47
385	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 50 mg	7 kaps. (blist.)	5909990980512	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	9,89	14,13	12,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,95
386	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 100 mg	28 kaps. (blist.)	5909990980611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	90,72	109,66	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	60,21
387	Fluconazolum	Mycosyst, kaps., 200 mg	7 kaps. (blist.)	5909991118914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	36,72	47,88	47,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	23,94
388	Fluticasonum	Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 poj.a 120 daw.	5909990570720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	17,82	21,50	8,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	17,20
389	Fluticasonum	Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw.	1 op.a 120 daw. (10 ml)	5909990294817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	22,14	26,12	8,60	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	21,82
390	Fluticasonum	Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 g	28 poj.	5909990933822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa	44,82	51,86	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha	50%	43,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
391	Furosemidum	Furosemidum Polfarmex, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990223794	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	37,0, Leki moczop dne - p tlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rdokowym ukkladzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci	ryczałt	3,20
392	Furosemidum	Furosemidum Polpharma,Furosemidum, tabl. , 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990135028	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	37,0, Leki moczop dne - p tlowe	2,46	3,69	3,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rdokowym ukkladzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci	ryczałt	3,20
393	Gabapentinum	Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990714322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	23,76	29,79	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	16,09
394	Gabapentinum	Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990714452	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	70,20	83,92	50,71	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	36,41
395	Gabapentinum	Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990714605	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	86,40	102,68	67,61	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	38,27
396	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990338542	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	82,30	100,87	100,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
397	Gabapentinum	Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990338658	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,39	135,56	135,22	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,08
398	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990339495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,48	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,78
399	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990339600	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	53,62	67,61	67,61	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	Gabapentinum	Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990339709	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,17	50,72	50,71	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,21
401	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990676088	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,60	27,48	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,78
402	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990676170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	64,80	78,14	50,71	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	30,63
403	Gabapentinum	Gabatem, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990676248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	83,16	99,22	67,61	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	34,81
404	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990768035	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	99,47	99,47	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
405	Gabapentinum	Gabatem, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990768059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	108,00	129,80	129,80	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	4,74
406	Gabapentinum	Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990651535	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	21,38	27,25	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	13,55
407	Gabapentinum	Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990651566	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	39,10	50,64	50,64	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
408	Gabapentinum	Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990651603	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	52,92	66,86	66,86	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
409	Gabapentinum	Neuran 600, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990055081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	81,00	99,47	99,47	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,56
410	Gabapentinum	Neuran 800, tabl. powl., 800 mg	100 tabl. (blist.)	5909990651696	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	113,40	135,57	135,22	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	5,09
411	Gabapentinum	Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps.	5909990769216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	42,37	49,71	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	36,01
412	Gabapentinum	Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps.	5909990769315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	89,24	104,30	50,71	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	56,79
413	Gabapentinum	Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps.	5909990769414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	119,88	138,51	67,61	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	74,10
414	Gabapentinum	Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909991017422	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	147,84	170,99	101,42	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	73,13
415	Gabapentinum	Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909991017521	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	141,50	165,64	135,22	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	35,16
416	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 600 mg	100 tabl.	5909990678747	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	90,48	109,61	101,42	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	11,75
417	Gabapentinum	Symleptic, tabl. powl., 800 mg	100 tabl.	5909990678792	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	126,24	149,31	135,22	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
418	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 100 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685554	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	26,00	32,19	16,90	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	18,49
419	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 300 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685561	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	63,72	76,98	50,71	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	29,47
420	Gabapentinum	Symleptic, kaps. twarde, 400 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990685660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna	97,84	114,93	67,61	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia	ryczałt	50,52
421	Haloperidolum	Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990722617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	177.2, Leki przeciwpsychotyczne - haloperidol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,16	6,23	6,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	choroba Huntingtona	30%	1,87
422	Hydrocortisonum	Hydrocortisonum AFP, krem, 0,01 g/1 g	15 g	5909990950317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabiej i redniej sile działania	1,77	2,65	2,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	1,33
423	Hydrocortisonum	Laticort 0,1%, plyn na skór , 1 mg/ml	20 ml	5909990229215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabiej i redniej sile działania	4,62	5,94	3,53	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory	50%	4,18
424	Indapamidum	Apo-Indap, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl.	5909990988716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	10,70	10,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,21
425	Indapamidum	Diuresin SR, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990975815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,30
426	Indapamidum	Indap, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991162917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,85	10,98	10,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,29
427	Indapamidum	Indapen, tabl. powl., 2,5 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990863013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	9,82	9,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,95
428	Indapamidum	Indapen SR, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665907	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,05	8,90	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,71
429	Indapamidum	Indapres, tabl. powl., 2,5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990223121	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,70	10,82	10,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
430	Indapamidum	Ipres long 1,5, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990012688	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,59	9,49	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,30
431	Indapamidum	Opamid, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990770182	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,43	9,31	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,12
432	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl.	5909990424801	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	6,97	9,90	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,71
433	Indapamidum	Rawel SR, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	60 tabl.	5909990424849	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	13,93	19,00	17,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,62
434	Indapamidum	Symapamid SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990734993	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	5,08	7,88	7,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	2,36
435	Indapamidum	Tertensif SR, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990738212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe	11,88	15,15	8,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia	30%	8,96
436	Ipratropii bromidum	Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 mcg/ml	20 ml	5909990322114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	8,99	13,15	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,45
437	Ipratropii bromidum	Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 mcg	10 ml (200 daw.)	5909990999019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	18,93	25,80	25,80	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	3,56
438	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 1 ml	5909990977710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	12,04	16,41	12,90	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	6,71
439	Ipratropii bromidum	Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml	20 amp.a 2 ml	5909990977727	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu	24,06	31,28	25,80	Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli	Mukowiscydoza, dysplazja oskrzelowo-płucna, dyskineza rz sek, ostre stany zapalne oskrzeli - w przypadku obturacji dróg oddechowych	ryczałt	9,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
440	Itraconazolum	Itragen, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990617463	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	79,92	98,10	98,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	49,05
441	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	4 kaps.	5909990858255	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	11,99	16,67	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	9,61
442	Itraconazolum	Itrax, kaps. twarde, 100 mg	28 kaps.	5909990858262	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	81,11	99,38	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	49,93
443	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909990004317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	13,28	18,05	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	10,99
444	Itraconazolum	Orungal, kaps., 100 mg	28 kaps.	5909990004331	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	54,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
445	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	4 kaps.	5909991053819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	14,90	19,78	14,13	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	12,72
446	Itraconazolum	Trioxal, kaps., 100 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909991053826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne	85,32	103,88	98,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	54,43
447	Ketoconazolum	Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg	10 tabl.	5909991045418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,72
448	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg	10 tabl. (blist.)	5909991042615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	6,42	9,43	9,43	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	4,72
449	Ketoconazolum	Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991042639	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol	13,85	19,07	18,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab	50%	9,64
450	Ketoprofenum	Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990412112	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,29	14,39	13,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,81
451	Ketoprofenum	Febrofen, kaps. o przedlu onym uwalnianiu, 200 mg	20 kaps. (2 blist.po 10 szt.)	5909990413317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	14,01	19,06	17,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	10,28
452	Ketoprofenum	Ketonal, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps.	5909990046492	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	4,86	7,12	6,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
453	Ketoprofenum	Ketonal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg	10 amp.a 2 ml	5909990659524	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego	6,48	9,51	9,51	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	4,76
454	Ketoprofenum	Ketonal DUO, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990064694	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	17,06	22,64	19,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	12,76
455	Ketoprofenum	Ketonal forte, tabl. powł., 100 mg	30 tabl.	5909990046485	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,39	15,58	13,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	9,00
456	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	14 kaps.	5909990813315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	7,88	10,23	6,15	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,16
457	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 100 mg	20 kaps.	5909990813322	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,23	14,44	8,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	10,05
458	Ketoprofenum	Ketores, kaps., 200 mg	20 kaps.	5909990813421	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	13,93	18,98	17,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	10,20
459	Ketoprofenum	Profenid, czopki, 100 mg	10 czop.	5909990098514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego	7,94	9,20	2,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,97
460	Ketoprofenum	Profenid, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990760718	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	9,54	13,59	13,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	7,01
461	Ketoprofenum	Profenid, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg	14 tabl. (1 blist.a 14 szt.)	5909990790418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	10,35	14,26	12,30	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,11
462	Ketoprofenum	Refastin, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675593	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne	11,34	15,52	13,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory	50%	8,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
463	Lamotriginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334766	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	24,84	33,24	33,24	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
464	Lamotriginum	Epitrigine 100 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	24,84	32,89	31,74	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,35
465	Lamotriginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334742	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,60	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,82
466	Lamotriginum	Epitrigine 25 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	6,21	9,05	7,94	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,31
467	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334759	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,20	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,57
468	Lamotriginum	Epitrigine 50 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990334957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	12,42	17,34	15,87	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	4,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
469	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,025 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990224661	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	8,37	11,37	7,94	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,63
470	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,1 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225149	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	23,76	31,74	31,74	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
471	Lamotriginum	Lameptil S, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,05 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990225170	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	12,96	17,91	15,87	Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	5,24
472	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038480	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
473	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038565	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	18,06	23,59	17,20	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	9,59
474	Lamotriginum	Lamilept, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990038701	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stale postacie farmaceutyczne	8,62	11,80	8,60	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego ukkladu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
475	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	22,68	28,54	17,20	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	14,54
476	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990346318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
477	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 100 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990346325	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	66,67	66,67	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
478	Lamotriginum	Lamitrin, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990354818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,96	16,45	8,60	Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	11,05
479	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	7,41	8,44	1,59	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	8,44
480	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990787210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne	16,20	19,74	7,94	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
481	Lamotriginum	Lamitrin S, tabl. do sporządzenia zawiesiny/dorozgrzania i użycia, 100 mg	30 tabl. (3 blist. po 10 szt.)	5909990787319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	64,80	75,65	31,74	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	47,11
482	Lamotriginum	Lamotrix, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909991006419	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	8,59	11,77	8,60	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	6,37
483	Lamotriginum	Lamotrix, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909991006518	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	17,98	23,50	17,14	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	9,56
484	Lamotriginum	Lamotrix, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909991006617	2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	34,39	34,39	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,20
485	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 25 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057382	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	9,89	14,20	13,23	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	4,17
486	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 100 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057566	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne	39,59	51,09	51,09	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
487	Lamotriginum	Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg	5 blist. po 10szt.	5909990057597	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postaci farmaceutyczne	19,80	26,87	26,45	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,62
488	Lamotriginum	Plexxo 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990972616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	29,75	38,49	34,39	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	7,30
489	Lamotriginum	Plexxo 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990972418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	17,28	21,07	8,60	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	15,67
490	Lamotriginum	Plexxo 50, tabl., 50 mg	30 tabl.	5909990972517	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	21,60	27,39	17,20	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	13,39
491	Lamotriginum	Symla 100, tabl., 100 mg	30 tabl.	5909990045303	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	23,89	32,22	32,22	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,20
492	Lamotriginum	Symla 25, tabl., 25 mg	30 tabl.	5909990045280	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postaci farmaceutyczne	6,10	9,11	8,60	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia	ryczałt	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
493	Lamotriginum	Symla 50, tabl. , 50 mg	30 tabl.	5909990045266	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,31	17,44	17,20	Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,44
494	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079292	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	6,21	9,22	8,60	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,82
495	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079339	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	12,42	17,57	17,20	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,57
496	Lamotriginum	Trogine, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990079483	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne	54,62	68,49	68,49	Padaczka oporna na leczenie	Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia	ryczałt	3,20
497	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg	1 amp.-strz	5909991094416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	2 703,73	2 951,68	2 459,90	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	494,98
498	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg	1 amp.-strz	5909991094515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu	3 604,62	3 930,73	3 689,84	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	244,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
499	Lanreotidum	Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg	1 amp.-strz.a 0,5 ml	5909991094614	2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	79.0, Hormony przysadki i podwzgórze - inhibitory hormonu wzrostu	4 514,86	4 919,79	4 919,79	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,27
500	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055135	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,07	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	8,53
501	Lansoprazolum	Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990055173	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,52	26,90	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	15,82
502	Lansoprazolum	Lantrea, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (but.)	5909990017850	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,70	32,44	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	21,36
503	Lansoprazolum	Lantrea, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (but.)	5909990017898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,85	16,83	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	11,29
504	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps.	5909990339365	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	9,10
505	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps.	5909990339402	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,80	14,64	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	9,10
506	Lansoprazolum	Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps.	5909990609970	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej ośrodkowej, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia	50%	12,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
507	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	7 kaps.	5909990727018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,71	16,39	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,62
508	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	14 kaps.	5909990727025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,07	22,41	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,87
509	Lansoprazolum	Lanzul, kaps., 30 mg	28 kaps.	5909990727032	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,57	30,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,08
510	Lansoprazolum	Lanzul S, kaps., 15 mg	28 kaps.	5909990869817	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,85	21,11	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,57
511	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623358	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,33
512	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990623440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	17,87	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,33
513	Lansoprazolum	Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990623457	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	34,42	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	23,34
514	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064045	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	11,32	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
515	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990064069	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,70	11,32	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,78
516	Lansoprazolum	Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990064076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,05	22,12	22,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,06
517	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (but.)	5909990977826	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	63,10	78,77	75,14	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	6,83
518	Leflunomidum	Arava, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (but.)	5909990977925	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	126,20	150,28	150,28	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	3,20
519	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	4037353010604	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	64,39	80,16	75,14	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	8,22
520	Leflunomidum	Leflunomide medac, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	4037353010628	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid	128,78	153,04	150,28	Aktywna posta reumatoidalnego zapalenia stawów	Młdzie cze idiopatyczne zapalenie stawów - posta wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu	ryczałt	5,96
521	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU	1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G	5909990742059	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	121,76	145,08	135,93	Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropeniczej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna	ryczałt	12,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
522	Lenograstimum	Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji do żylnych, 33,6 MIU	5 fiolek z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G	5909990742066	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów	608,76	679,61	679,61	Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych	Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna	ryczałt	3,20
523	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990006649	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	172,80	201,00	180,75	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	23,45
524	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990006670	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	356,40	401,45	361,50	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	45,28
525	Levetiracetamum	Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml	300 ml (but.)	5909990006755	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne	169,56	197,94	177,06	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	24,08
526	Levetiracetamum	Keppra, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml	10 fiolek a 5 ml	5909990610891	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - levetiracetam	595,03	665,10	665,10	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	3,20
527	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990901111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	52,92	66,19	60,25	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	9,14
528	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990901128	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	133,75	120,50	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	16,45
529	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990901210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	133,75	120,50	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	16,45
530	Levetiracetamum	Keppra, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990901227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	234,36	268,33	241,00	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia	ryczałt	30,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
531	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990901319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	234,36	268,33	241,00	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	30,89
532	Levetiracetamum	Keppra , tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990901326	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	478,44	534,57	482,00	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	59,68
533	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg	50 tabl.	5909990879076	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	47,36	60,25	60,25	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
534	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990879106	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	99,92	120,48	120,48	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
535	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990879168	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	99,92	120,48	120,48	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
536	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg	100 tabl.	5909990879199	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	208,77	240,94	240,94	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,56
537	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg	50 tabl.	5909990879250	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	153,85	180,73	180,73	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
538	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg	100 tabl.	5909990879281	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	319,01	361,45	361,45	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	5,33
539	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	50 tabl.	5909990879342	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	208,77	240,94	240,94	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	3,56
540	Levetiracetamum	Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg	100 tabl.	5909990879373	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne	429,24	481,93	481,93	Padaczka oporna na leczenie	Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia	ryczałt	7,11
541	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powł., 5 mg	20 tabl.	5909990656929	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	13,39	17,14	10,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	9,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542	Levocetirizini dihydrochloridum	Cezera, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990656943	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,65	22,70	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,94
543	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, roztwór doustny , 0,5 mg/ml	200 ml	5909990904099	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	18,14	23,79	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	10,64
544	Levocetirizini dihydrochloridum	Contrahist, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990904129	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,47	21,27	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	11,23
545	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	7 tabl.	5909990918041	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,10	9,75	3,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	7,24
546	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990918072	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	27,43	33,01	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	22,97
547	Levocetirizini dihydrochloridum	Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml	200 ml (but.)	5909990619627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne	24,19	30,26	18,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	17,11
548	Levocetirizini dihydrochloridum	Zenaro, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	18,77	23,74	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	13,70
549	Levocetirizini dihydrochloridum	Zyx, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990765034	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,73	14,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry	30%	12,69
550	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 12,5+50 mg	100 kaps.	5909990094912	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,65
551	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990095018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	58,36	52,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,56
552	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. , 50+200 mg	100 tabl.	5909990095117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
553	Levodopum + Benserazidum	Madopar, kaps., 50+200 mg	100 kaps.	5909990095216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	85,00	103,99	103,99	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
554	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 12,5+50 mg	100 tabl.	5909990748624	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	25,74	33,45	26,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555	Levodopum + Benserazidum	Madopar, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 100+25 mg	100 tabl.	5909990748723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	58,36	52,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,56
556	Levodopum + Benserazidum	Madopar HBS, kaps., 100+25 mg	100 kaps.	5909990377510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	46,08	58,36	52,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	9,56
557	Levodopum + Carbidopum	Nakom, tabl. , 250+25 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909990175215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	51,84	69,65	69,65	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,44
558	Levodopum + Carbidopum	Nakom Mite, tabl. , 100+25 mg	100 tabl.	5909990175314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	43,20	55,27	52,00	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	6,47
559	Levodopum + Carbidopum	Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg	100 tabl. (but.)	5909990020416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy	78,24	96,77	96,77	Choroba i zespół Parkinsona	Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,56
560	Loratadinum	Aleric, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990880836	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,82	22,88	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	12,12
561	Loratadinum	Claritine, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990121526	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	25,92	31,55	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	20,79
562	Loratadinum	Claritine, syrop, 1 mg/ml	120 ml	5909990355419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	12,96	16,96	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	9,07
563	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990223343	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,87	34,72	30,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	13,20
564	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990223350	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,84	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
565	Loratadinum	Flonidan, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990739233	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	16,20	21,15	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	10,39
566	Loratadinum	Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml	120 ml	5909990739318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	9,72	13,49	11,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	5,60
567	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990670253	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	26,42	34,24	30,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	12,72
568	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	90 tabl. (9 blist.po 10 szt.)	5909990670260	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	40,31	50,84	46,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	18,56
569	Loratadinum	Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990795420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,39	22,42	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,66
570	Loratadinum	Loratan, syrop, 5 mg/5ml	125 ml (but.)	5909990839018	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne	8,93	12,76	11,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	4,54
571	Loratadinum	Loratan, kaps. mi kkie, 10 mg	30 kaps. (2 blist.po 15 szt.)	5909990909049	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	17,02	22,02	15,37	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Atopowe zapalenie skóry; Alergie pokarmowe, reakcje anafilaktyczne (pokrzywka, obrz k naczyńioruchowy Quinckego) - od 6 miesi ca ycia	30%	11,26
572	Losartanum	Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990702886	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,04	21,00	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t niczne, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,12
573	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990674411	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,35	21,33	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t niczne, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
574	Losartanum	Cozaar, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,40	40,68	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	18,91
575	Losartanum	Lakea, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991108212	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	20,52	25,96	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	14,30
576	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990638659	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	32,88	41,19	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	19,42
577	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	56 tabl.	5909990649112	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	31,44	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,67
578	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	84 tabl. (6 blist.po 14 szt.)	5909990649129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	25,92	35,50	35,50	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,65
579	Losartanum	Lorista, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990818914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	21,18	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,30
580	Losartanum	Losacor, tabl. powl., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991055110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	14,04	19,03	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,37
581	Losartanum	Losagen, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639885	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	10,80	15,40	15,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	4,62
582	Losartanum	Losagen, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990639908	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,22	30,86	30,86	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,26
583	Losartanum	Losargamma , tabl. powl., 50 mg	28 tabl. powl.	5909990947164	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	8,64	13,09	13,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,93
584	Losartanum	Losartan Arrow, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990769469	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	13,50	18,46	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,80
585	Losartanum	Losartic, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	16,20	21,18	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,30
586	Losartanum	Lozap 50, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990573905	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	17,82	23,08	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	11,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
587	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724345	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,12	20,19	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,53
588	Losartanum	Presartan, tabl. powł., 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990724352	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,78	39,19	33,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	15,87
589	Losartanum	Rasoltan 50, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990085644	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	13,09	13,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	3,93
590	Losartanum	Sarve 50 mg, tabl. powł., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990045594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,63	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	7,75
591	Losartanum	Stadazar, tabl. powł., 50 mg	28 tabl.	5909990079575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,40	15,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,62
592	Losartanum	Xartan, tabl. powł., 50 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990481118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	30,59	16,66	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	18,93
593	Lovastatinum	Liprox, tabl., 20 mg	28 tabl.	5909990842315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,04	17,30	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,13
594	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990422159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	21,60	25,39	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	20,22
595	Lovastatinum	Lovasterol, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990828425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	18,60	3,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	15,83
596	Lovastatinum	Lovastin, tabl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990756629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	18,46	7,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,29
597	Medroxyprogesteronum	Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwań, 150 mg/ml	1 fioł.a 3,3 ml	5909990236510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego	11,23	15,92	15,92	Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy	Limfangioleiomiomatoza	ryczałt	3,20
598	Mesalazinum	Asamax 250, czopki, 250 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083816	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	44,99	57,06	50,69	Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	9,57
599	Mesalazinum	Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084011	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	40,96	51,54	41,21	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia	ryczałt	13,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	Mesalazinum	Asamax 500, czopki, 500 mg	30 czop. (5 blist.po 6 szt.)	5909991083915	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	93,45	112,91	101,37	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	14,74
601	Mesalazinum	Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)	5909991084110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	70,73	87,12	82,41	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	8,27
602	Mesalazinum	Crohnax, czopki, 250 mg	30 czop. (6 blist.po 5 szt.)	5909991074012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	23,76	34,35	34,35	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
603	Mesalazinum	Pentasa, czopki, 1000 mg	28 czop. (blist.)	5909990656813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	165,24	193,43	189,22	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	7,41
604	Mesalazinum	Pentasa , czopki, 1000 mg	14 czop. (blist.)	5909990656820	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,62	101,03	94,61	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	9,62
605	Mesalazinum	Pentasa , tabl. o przedu onym uwalnianiu, 500 mg	100 tabl. (blist.)	5909990662111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	133,98	154,81	82,41	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	75,96
606	Mesalazinum	Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml	7 szt.a 100 ml	5909990818815	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	81,00	94,12	36,80	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	60,52
607	Mesalazinum	Salofalk , zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml	7 but.a 60 ml	5909990970117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne	123,47	147,21	147,21	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
608	Mesalazinum	Salofalk 250, czopki, 250 mg	30 czop.	5909990088829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	47,73	60,00	50,69	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	12,51
609	Mesalazinum	Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg	50 tabl.	5909990400010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	26,78	33,63	20,60	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	16,23
610	Mesalazinum	Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990400119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	43,02	53,74	41,21	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	15,73
611	Mesalazinum	Salofalk 500, czopki, 500 mg	30 czop.	5909990422227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne	82,66	101,37	101,37	Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego	Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
612	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg	50 tabl.	5909990453726	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	8,09	11,76	10,58	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne	ryczałt	6,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
613	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg	50 tabl.	5909990453825	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,18	22,27	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne	ryczałt	11,78
614	Methotrexatum	Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg	50 tabl.	5909990453924	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	32,36	42,32	42,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne	ryczałt	21,33
615	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 2,5 mg	100 tabl. (but.)	5909990111619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	16,19	22,29	21,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne	ryczałt	11,80
616	Methotrexatum	Trexan, tabl. , 10 mg	100 tabl. (1 poj.po100 szt)	5909990730346	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego	64,80	80,76	80,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroby autoimmunizacyjne	ryczałt	42,67
617	Metoprololum	Metocard, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034420	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	3,95	5,29	3,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadei nienie t tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,88
618	Metoprololum	Metocard, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990034529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego	6,38	8,91	7,21	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadei nienie t tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,90
619	Mycophenolas mofetil	CellCept, tabl. , 500 mg	50 tabl.	5909990707515	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,47	370,47	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620	Mycophenolas mofetil	CellCept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990707614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,39	370,47	370,47	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
621	Mycophenolas mofetil	CellCept, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml	110 g (175 ml)	5909990980918	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	291,60	336,74	336,74	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
622	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)	5909990752003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	115,16	144,45	144,45	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
623	Mycophenolas mofetil	Limfocept, kaps. twarde, 250 mg	300 kaps. (30 blist.po 10 szt.)	5909990752034	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	259,33	316,18	316,18	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
624	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990752355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	178,20	211,90	211,90	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
625	Mycophenolas mofetil	Limfocept, tabl. powł., 500 mg	150 tabl. (15 blist.po 10 szt.)	5909990752362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	534,60	610,71	610,71	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
626	Mycophenolas mofetil	Mofimutral, tabl. powl., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990796069	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	167,40	200,35	200,35	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
627	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990718375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	318,80	318,80	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
628	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990718405	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	278,10	318,80	318,80	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
629	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps. (10 blist.po 10)	5909990074563	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	114,48	143,72	143,72	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990715268	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	140,40	171,46	171,46	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
631	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg	100 kaps.	5909990807703	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	194,57	194,57	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
632	Mycophenolas mofetil	Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powl., 500 mg	50 tabl.	5909990807741	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	162,00	194,57	194,57	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
633	Mycophenolas mofetil	Myfenax, kaps. twarde, 250 mg	100 kaps.	5909990638185	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	370,22	370,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
634	Mycophenolas mofetil	Myfenax, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990638208	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	326,16	370,22	370,22	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
635	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 250 mg	100 tabl.	5909990885091	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	339,02	339,02	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
636	Mycophenolas mofetil	Nolfemic, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990885107	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne	297,00	339,02	339,02	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuowego oraz twardziny układuowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
637	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwa , 2850 j.m Axa/0,3ml	10 amp.-strz.a 0,3 ml	5909990075621	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	47,97	60,67	53,59	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;	ryczałt	10,28
638	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwa , 5700 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990075720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych	103,47	124,04	107,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;	ryczałt	20,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
639	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwa , 9500 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990075829	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	160,54	188,31	178,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;	ryczałt	13,24
640	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwa , 3800 j.m. Axa/0,4ml	10 amp.-strz.a 0,4 ml	5909990716821	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	64,39	79,85	71,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;	ryczałt	11,60
641	Nadroparinum calcicum	Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwa , 7600 j.m. Axa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990716920	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	128,00	151,90	142,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego;	ryczałt	12,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
642	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwa , 11400 j.m. Axa/0,6ml	10 amp.-strz.a 0,6 ml	5909990836932	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	183,88	214,09	214,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	4,27
643	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwa , 15200 j.m. AXa/0,8ml	10 amp.-strz.a 0,8 ml	5909990837038	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	263,00	300,35	285,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	20,23
644	Nadroparinum calcicum	Fraxodi, roztwór do wstrzykiwa , 19000 j.m. Axa/ml	10 amp.-strz.a 1 ml	5909990837137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych	307,17	349,22	349,22	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	ryczałt	7,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
645	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990139613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,38	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,55
646	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990139620	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,05	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
647	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990277216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,32	4,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,51
648	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (2 blist.po 30 szt.)	5909990277223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,55	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,72
649	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694754	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	11,34	16,05	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	6,40
650	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	5,66	8,38	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,55
651	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990694778	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	3,83	5,32	4,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	4,51
652	Nitrendipinum	Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg	60 tabl. (4 blist.po 15szt.)	5909990694785	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny	7,69	10,55	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	5,72
653	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042715	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	37,80	50,72	50,72	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji wyst pujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
654	Octreotidum	Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml	5 amp.a 1 ml	5909990042913	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	48,60	66,28	66,28	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
655	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 20 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459612	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	4 320,00	4 708,68	4 699,18	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,70
656	Octreotidum	Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 10 mg	1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml	5909990459711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd	2 160,00	2 368,59	2 349,59	Akromegalia	Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	22,20
657	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990806751	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	41,58	54,46	54,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
658	Olanzapinum	Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990806799	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	83,70	103,54	103,54	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
659	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (blis.)	5909990703302	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	53,81	67,94	66,14	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,00
660	Olanzapinum	Lanzapin, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (blis.)	5909990703685	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	107,61	129,50	129,50	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
661	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blis.)	5909990697526	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,13	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,60
662	Olanzapinum	Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (blis. Alu/Alu)	5909990697649	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	99,36	120,29	120,29	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
663	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990793341	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,82	60,82	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
664	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990793365	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	115,67	115,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
665	Olanzapinum	Olanzapine Apotex, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990793389	2012-05-01/2012-09-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	95,04	115,67	115,67	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
666	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (blist.)	5909990638253	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,82	60,82	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
667	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990638338	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	123,76	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,50
668	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990638444	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,82	60,82	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
669	Olanzapinum	Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990638482	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	123,76	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,50
670	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990766895	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	56,20	56,20	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
671	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990766901	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	106,42	106,42	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
672	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990767045	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	43,20	56,20	56,20	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
673	Olanzapinum	Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990767052	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	86,40	106,42	106,42	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
674	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637126	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	64,29	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
675	Olanzapinum	Olanzin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990637218	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,68	124,91	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,65
676	Olanzapinum	Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990769094	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	102,60	123,76	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,50
677	Olanzapinum	Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990768950	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,70	70,65	61,73	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	12,12
678	Olanzapinum	Olazax, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990782239	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	55,04	55,04	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
679	Olanzapinum	Olazax, tabl., 10 mg	28 tabl.	5909990782246	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	104,11	104,11	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
680	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990782253	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	42,12	55,04	55,04	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
681	Olanzapinum	Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990782260	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	84,24	104,11	104,11	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
682	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 5 mg	28 tabl.	5909990781782	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,76	64,29	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,76
683	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990781805	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	108,00	129,53	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	9,27
684	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (blist.)	5909990832774	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	54,00	68,15	66,14	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,21
685	Olanzapinum	Olpinat, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (blist.)	5909990832781	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	115,56	138,01	132,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	8,93
686	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335343	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	51,84	65,44	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
687	Olanzapinum	Olzapin, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990335367	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	105,84	127,22	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,96
688	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729081	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	103,14	124,34	123,46	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,08
689	Olanzapinum	Olzin, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990729159	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	47,52	60,82	60,82	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
690	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743599	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	44,28	57,75	57,75	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
691	Olanzapinum	Parnassan, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990743629	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	91,80	112,59	112,59	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
692	Olanzapinum	Ranofren, tabl. , 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990640287	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	101,63	122,72	122,72	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
693	Olanzapinum	Sanza 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692668	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	100,44	121,45	121,45	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
694	Olanzapinum	Sanza 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990692590	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,22	63,72	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,19
695	Olanzapinum	Synza 10 mg, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704866	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	105,30	126,64	123,46	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,38
696	Olanzapinum	Synza 5 mg, tabl. powł., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990704750	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	50,21	63,69	61,73	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,16
697	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	49,63	63,08	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
698	Olanzapinum	Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl. (blist.Alu-OPA)	5909990069866	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	102,33	123,46	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
699	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081812	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	49,63	63,08	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	4,55
700	Olanzapinum	Zalasta, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909991081911	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	102,33	123,46	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
701	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powl., 5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990647804	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	48,60	61,98	61,73	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,45
702	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990647835	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	54,00	68,15	66,14	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	5,21
703	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990648139	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	97,20	117,98	117,98	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
704	Olanzapinum	Zapilux, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990648160	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	108,00	129,93	129,93	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	3,20
705	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990916917	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,16	70,46	66,14	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,52
706	Olanzapinum	Zolafren, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909990917013	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,40	135,70	132,28	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,62
707	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064518	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	56,16	70,46	66,14	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,52
708	Olanzapinum	Zolafren, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991064716	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	113,40	135,70	132,28	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,62
709	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990775675	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stale postacie farmaceutyczne	52,35	65,98	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	Olanzapinum	Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990775682	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	128,38	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	8,12
711	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 5 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991096816	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	56,16	70,46	66,14	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,52
712	Olanzapinum	Zolaxa, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909991097011	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	113,40	135,70	132,28	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	6,62
713	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg	28 tabl.	5909990892082	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	52,35	65,98	61,73	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	7,45
714	Olanzapinum	Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg	28 tabl.	5909990892129	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	106,92	128,38	123,46	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	8,12
715	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powl., 5 mg	28 tabl.	5909990743117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	85,19	101,13	61,73	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	42,60
716	Olanzapinum	Zyprexa, tabl. powl., 10 mg	28 tabl.	5909990743315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	170,39	196,29	123,46	Schizofrenia	Zaburzenia ruchowe (pl sawica) w chorobie Huntingtona	ryczałt	76,03
717	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990068401	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,45	11,05	11,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,53
718	Omeprazolom	Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990068425	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,60	18,42	18,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,21
719	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	14 kaps. (pojem.)	5909990880218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,26	14,07	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720	Omeprazolom	Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg	28 kaps. (pojem.)	5909990880225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,35
721	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990420513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,90	17,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,89
722	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990420520	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,63	25,16	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	19,62
723	Omeprazolom	Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990420537	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,84	26,18	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,10
724	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	14 kaps.	5909990877317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	12,12	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,35
725	Omeprazolom	Helicid 10, kaps., 10 mg	28 kaps.	5909990877324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	22,73	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,19
726	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	14 kaps. (but.)	5909990420612	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,20	20,42	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,88
727	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990420629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,59	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
728	Omeprazolom	Helicid 20, kaps., 20 mg	90 kaps. (but.)	5909990422654	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	57,24	71,28	71,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	35,67
729	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 tabl.	5909990889600	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,69	18,52	18,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,26
730	Omeprazolom	Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 tabl.	5909990891351	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	25,38	34,83	34,83	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	17,42
731	Omeprazolom	Losec, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990193721	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	29,51	34,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	29,12
732	Omeprazolom	Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps.	5909991100926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,58	18,40	18,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,20
733	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613205	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,36	24,59	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,51
734	Omeprazolom	Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg	56 kaps. (8 blist.po 7 szt.)	5909990615230	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	42,33	42,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	21,17
735	Omeprazolom	Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990613359	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	32,40	42,33	42,33	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	21,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	14 kaps. (2 blist.po 7 szt.)	5909990772629	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	25,61	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	20,07
737	Omeprazolom	Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990772667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	23,22	29,79	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	18,71
738	Omeprazolom	Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg	28 kaps. (4 blist.po 7 szt.)	5909990077731	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	34,56	44,64	44,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	22,48
739	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	14 kaps.	5909990772919	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	12,96	16,95	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,41
740	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	7 kaps.	5909990772926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,48	8,65	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,88
741	Omeprazolom	Prazol, kaps., 20 mg	28 kaps.	5909990772933	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,28	23,43	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,35
742	Omeprazolom	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	14 kaps. (but.)	5909990635443	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,94	13,72	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,18
743	Omeprazolom	Progastim, kaps. dojel., 20 mg	28 kaps. (but.)	5909990635450	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,28	19,16	19,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
744	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990048809	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	24,90	33,65	33,65	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
745	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 300 mg	50 tabl.	5909990048823	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	49,68	63,67	63,67	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
746	Oxcarbazepinum	Karbagen, tabl. powl., 600 mg	50 tabl.	5909990048854	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	98,28	119,67	119,67	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
747	Oxcarbazepinum	Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml	250 ml	5909990747115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - płynne postacie farmaceutyczne	86,63	105,82	105,82	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
748	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 150 mg	50 tabl.	5909990825516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	29,80	38,90	33,67	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	8,43
749	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 300 mg	50 tabl.	5909990825615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	57,24	71,76	67,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	7,61
750	Oxcarbazepinum	Trileptal, tabl. , 600 mg	50 tabl.	5909990825714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne	112,32	134,69	134,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia	ryczałt	3,20
751	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,21	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,67
752	Pantoprazolum	Anesteloc, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990621040	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,08
753	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,30	14,10	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128432	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,67	25,99	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,91
755	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909991128814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	5,16	7,24	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	4,47
756	Pantoprazolum	Contix, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991128838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,69	14,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,98
757	Pantoprazolum	Contraacid, tabl. powł. dojelitowe, 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736706	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,16	12,88	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,34
758	Pantoprazolum	Contraacid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990736720	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	18,34	24,57	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,49
759	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl. (blist.)	5909990478767	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,02	9,23	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,46
760	Pantoprazolum	Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478774	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,04	18,11	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,57
761	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl. (blist.)	5909990689842	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	9,72	13,48	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
762	Pantoprazolum	Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990689859	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,44	25,74	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,66
763	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990653409	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,17	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,63
764	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990653508	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,56	11,17	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,63
765	Pantoprazolum	Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990653539	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,50	19,39	19,39	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,70
766	Pantoprazolum	IPP 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blist.)	5909990085033	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,37	14,18	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	8,64
767	Pantoprazolum	IPP 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blist.)	5909990082643	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,69	26,01	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,93
768	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645640	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,60	15,49	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,95
769	Pantoprazolum	Noacid, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990645732	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	20,50	26,88	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	15,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
770	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075003	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	10,82	14,66	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,12
771	Pantoprazolum	Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg	56 tabl.	5909990075041	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,65	19,56	19,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,78
772	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990075089	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	19,68	26,00	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	14,92
773	Pantoprazolum	Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg	56 tabl.	5909990075126	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	27,54	37,14	37,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	18,57
774	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 20 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	11,34	15,21	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,67
775	Pantoprazolum	Panogastin, tabl. dojel., 40 miligramy	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990646272	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	21,06	27,47	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	16,39
776	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990698974	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,18	10,76	10,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,38
777	Pantoprazolum	Panrazol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990699209	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	14,42	20,38	20,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
778	Pantoprazolum	Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (blis.Alu/Alu)	5909990780549	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	7,35	10,94	10,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,47
779	Pantoprazolum	Pantogen 40, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (blis.Alu/Alu)	5909990780587	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	15,66	21,70	21,70	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	10,85
780	Pantoprazolum	Pantopraz 40 mg, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blis.po 14 szt.)	5909990889167	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	16,09	22,16	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	11,08
781	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl.	5909990652303	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	4,35	6,37	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	3,60
782	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl.	5909990652334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,82	12,52	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,98
783	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990652358	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,69	12,38	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	6,84
784	Pantoprazolum	Panzol, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl.	5909990652372	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,77	23,95	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	12,87
785	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	14 tabl.	5909990730094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	3,46	5,42	5,42	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
786	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730100	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,47	10,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,24
787	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	14 tabl.	5909990730162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	6,91	10,47	10,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	5,24
788	Pantoprazolum	Ranloc, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990730179	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	13,82	19,73	19,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	9,87
789	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059546	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	8,86	12,56	11,08	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	7,02
790	Pantoprazolum	Xotepic, tabl. dojel., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990059591	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie	17,93	24,13	22,16	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia	50%	13,05
791	Pegfilgrastimum	Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml	1 amp.-str.za 0,6 ml (z zab.igly)	5909990007523	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów	3 286,98	3 587,47	3 587,47	Nowotwory zło liwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych	Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o zało eniu radykalnym	ryczałt	3,20
792	Phenobarbitalum	Luminalum, czopki, 15 mg	10 czop. (2 blist.po 5 szt.)	5909990148813	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doodbytniczego	2,15	3,22	3,22	Padaczka	Padaczka u dzieci do 30 miesi ca ycia	ryczałt	3,20
793	Phenobarbitalum	Luminalum, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990260614	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,40	6,58	6,56	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,22
794	Phenobarbitalum	Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg	10 tabl.	5909990812615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego	4,38	6,56	6,56	Padaczka	Padaczka u dzieci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
795	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 U	12 tabl.	5909990070916	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	4,54	6,56	5,85	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,91
796	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m.	12 tabl.	5909990071012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne	5,94	8,77	8,77	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
797	Phenoxymethylpenicillinum	Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml	60 ml (but.)	5909990363216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne	7,02	10,26	10,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	ryczałt	3,20
798	Prednisolonum	Encortolon, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990170715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon	4,54	6,80	6,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
799	Prednisonum	Encorton, tabl. , 1 mg	20 tabl.	5909990170616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	3,50	3,99	0,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	3,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
800	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	20 tabl.	5909990297016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	4,54	6,07	4,01	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	5,26
801	Prednisonum	Encorton, tabl. , 5 mg	100 tabl.	5909990297023	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	15,44	21,06	20,06	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	6,33
802	Prednisonum	Encorton, tabl. , 10 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405329	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	8,53	11,44	8,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby płuc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komórek i szpiku	ryczałt	6,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803	Prednisonum	Encorton, tabl. , 20 mg	20 tabl. (fiol.)	5909990405428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-09-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison	11,34	16,05	16,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia; Miastenia i zespolo miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne; Obturacyjne choroby pluc, choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego; Stan po przeszczepie narz du, ko czyny, tkanek, komorek i szpiku	ryczałt	4,27
804	Propafenonum	Polfenon, tabl. powl., 150 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034123	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0. Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	5,29	7,70	6,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotow nadkomorowych zaburze rytmu serca zwlaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionkow bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespolo WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,98
805	Propafenonum	Polfenon, tabl. powl., 300 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990034215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	30.0. Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon	9,61	13,84	13,84	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotow nadkomorowych zaburze rytmu serca zwlaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionkow bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespolo WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
806	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 10 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,17	2,65	1,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw eniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	2,65
807	Propranololum	Propranolol WZF, tabl. , 40 mg	50 tabl. (2 blist.po 25szt.)	5909990112210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	3,03	4,54	4,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw eniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia; Naczyniaki płaskie, naczyniaki jamiste	ryczałt	3,20
808	Quetiapinum	Bonogren, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990719389	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,53	11,61	7,47	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	7,34
809	Quetiapinum	Etiagen, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990806355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,91	9,87	7,47	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,60
810	Quetiapinum	Gentiapin, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990713646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,29	12,42	7,47	Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	8,15
811	Quetiapinum	Kefrenex, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990722198	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,67	9,62	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,35
812	Quetiapinum	Ketilept, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990055531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	9,72	12,88	7,47	Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	8,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
813	Quetiapinum	Ketipinor, tabl. powl., 25 mg	10 blist. po 10szt.	5909990058808	2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	21,11	28,40	24,90	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	6,70
814	Quetiapinum	Ketrel, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (pojem.)	5909990430840	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	8,64	11,73	7,47	Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	7,46
815	Quetiapinum	Kventiax 25, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990074068	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,64	9,58	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,31
816	Quetiapinum	Kwetaplex, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990688241	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,65	9,60	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,33
817	Quetiapinum	Kwetax, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990692804	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,62	8,49	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	4,22
818	Quetiapinum	Pinexet 25 mg, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990788583	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,64	8,51	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	4,24
819	Quetiapinum	Poetra, tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990742547	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,53	8,40	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	4,13
820	Quetiapinum	Quentapil , tabl. powl., 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990717705	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,66	9,61	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,34
821	Quetiapinum	Quetiser, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990763238	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	4,32	7,11	7,11	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	3,20
822	Quetiapinum	Stadaquel, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990727056	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	6,97	9,95	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	5,68
823	Quetiapinum	Symquel, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990635382	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,56	8,43	7,47	Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	4,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
824	Quetiapinum	Vorta, tabl. powł., 25 mg	30 tabl. (5 blist.po 6 szt.)	5909990778072	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne	5,63	8,50	7,47	Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa	Zaburzenia psychiczne inne ni wymienione w charakterystyce produktu leczniczego u chorych z ot pieniem	ryczałt	4,23
825	Quinaprilum	Accupro 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909990707010	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	18,36	20,77	3,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	20,15
826	Quinaprilum	Accupro 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990707119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	22,68	26,45	7,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	23,07
827	Quinaprilum	Accupro 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl.	5909991080129	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	35,64	41,73	14,27	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	35,42
828	Quinaprilum	Accupro 5, tabl. powł., 5 mg	30 tabl.	5909990706914	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,80	16,41	1,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,41
829	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125417	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,34	12,69	1,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	12,69
830	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,58	16,72	3,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,10
831	Quinaprilum	Acurenal, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909991125615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,40	7,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,02
832	Quinaprilum	Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014439	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,83	3,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	13,21
833	Quinaprilum	Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014460	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,20	19,52	7,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	16,14
834	Quinaprilum	Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990014507	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,80	15,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	27,04
835	Quinaprilum	Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)	5909990014354	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,97
836	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215737	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,72	10,97	1,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	10,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
837	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215805	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	13,83	3,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,21
838	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215898	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	19,40	7,65	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	16,02
839	Quinaprilum	Quinaprilum 123ratio, Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990215980	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,08	33,80	15,29	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	27,04
840	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	30 tabl.	5909990571468	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,66	21,64	21,64	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
841	Ramiprilum	Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg	60 tabl.	5909990571475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	24,84	34,14	34,14	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	25,60
842	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	30 tabl.	5909990571499	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,64	12,28	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,21
843	Ramiprilum	Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg	60 tabl.	5909990571505	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,77	19,61	19,61	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
844	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653355	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,60	5,42	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,27
845	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653362	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,60	10,99	10,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,25
846	Ramiprilum	Apo-Rami, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990653379	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,03	20,73	20,73	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
847	Ramiprilum	Axtil, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337958	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,36	6,35	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,81
848	Ramiprilum	Axtil, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337972	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	8,69	12,33	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,26
849	Ramiprilum	Axtil, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990337989	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	23,36	22,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
850	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,89	5,85	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,31
851	Ramiprilum	Mitrip, tabl. , 5 mg	30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)	5909991110710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,35	11,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
852	Ramiprilum	Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990661756	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,36	20,02	20,02	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
853	Ramiprilum	Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212170	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	8,62	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,08
854	Ramiprilum	Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990212248	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	9,61	13,31	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	8,24
855	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694631	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,30	10,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,56
856	Ramiprilum	Polpril, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990694655	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	21,86	21,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,40
857	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 10 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990052653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	20,98	27,33	22,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	17,19
858	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644551	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,49	8,63	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,09
859	Ramiprilum	Ramicor, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990644575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,88	16,81	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,74
860	Ramiprilum	Ramistad 10, tabl. , 10 mg	28 tabl.	5909990017461	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	16,20	16,20	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
861	Ramiprilum	Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg	28 tabl.	5909990017447	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,24	5,04	5,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
862	Ramiprilum	Ramistad 5, tabl. , 5 mg	28 tabl.	5909990017454	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	6,48	9,80	9,80	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
863	Ramiprilum	Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047987	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	15,34	21,05	21,05	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	11,95
864	Ramiprilum	Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047949	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	3,46	5,28	5,28	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
865	Ramiprilum	Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990047963	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,78	11,18	10,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,44
866	Ramiprilum	Tritace 10, tabl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990916016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	19,76	25,78	21,41	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	16,32
867	Ramiprilum	Tritace 2,5, tabl., 2,5 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990478217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	12,85	15,33	5,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	13,18
868	Ramiprilum	Tritace 5, tabl., 5 mg	28 tabl.	5909990478316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,52	20,54	10,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	15,80
869	Ramiprilum	Vivace 10 mg, tabl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610532	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	16,09	22,09	22,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	12,80
870	Ramiprilum	Vivace 2,5 mg, tabl., 2,5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610440	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	4,00	5,97	5,74	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,43
871	Ramiprilum	Vivace 5 mg, tabl., 5 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990610495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone	7,88	11,47	11,47	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	6,40
872	Ranitidinum	Ranigast, tabl. powł., 150 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990206728	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H ₂ - stosowane doustnie	8,18	11,87	11,87	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	3,20
873	Risedronatum natricum	Risendros 35, tabl. powł., 35 mg	4 tabl.	5909990082599	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy	14,68	19,40	13,39	Osteoporoza	Profilaktyka osteoporozy posterydowej	30%	10,03
874	Rivastigminum	Exelon, kaps., 1,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781119	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	114,66	124,92	6,92	Choroba Alzheimerera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	120,08
875	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781218	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	119,19	131,34	13,84	Choroba Alzheimerera	Otępienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	121,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
876	Rivastigminum	Exelon, kaps., 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781225	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	262,47	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	243,09
877	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781317	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	132,49	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	117,96
878	Rivastigminum	Exelon, kaps., 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781324	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	264,20	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	235,14
879	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990781416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	119,19	133,49	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	114,11
880	Rivastigminum	Exelon, kaps., 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990781423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	239,72	265,62	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	226,88
881	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990700646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	35,21	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,37
882	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990700660	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	30,81	35,21	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	30,37
883	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990700684	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	39,41	45,99	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,30
884	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg	28 tabl.	5909990700691	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	35,67	41,98	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	32,29
885	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990700707	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	80,90	92,53	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	73,15
886	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990700738	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	44,67	52,77	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	38,24
887	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg	28 tabl.	5909990700745	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	40,93	48,77	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	34,24
888	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990700752	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,25	106,41	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	77,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
889	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990700790	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	55,53	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,15
890	Rivastigminum	Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg	28 tabl.	5909990700806	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	55,53	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,15
891	Rivastigminum	Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990700844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	103,84	120,23	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	81,49
892	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990782048	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	11,58	14,62	6,92	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,78
893	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg	56 kaps.	5909990782055	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,16	28,59	13,84	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,90
894	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990782079	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	23,16	28,59	13,84	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,90
895	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990782086	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	55,53	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,15
896	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990782147	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,74	42,14	20,76	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,61
897	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990782154	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	69,48	82,04	41,51	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,98
898	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990782178	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,32	55,53	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,15
899	Rivastigminum	Ristidic, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990782185	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	92,64	108,24	55,35	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	69,50
900	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990816255	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	46,31	55,52	27,68	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,14
901	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990816262	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera	34,73	42,13	20,76	Choroba Alzheimerera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
902	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990816279	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,47	82,03	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,97
903	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990816286	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,32	55,53	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,15
904	Rivastigminum	Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990816293	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,62	108,22	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	69,48
905	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990778898	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	11,56	14,60	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,76
906	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990778935	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	23,13	28,56	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,87
907	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990778942	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	55,47	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,09
908	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990778966	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,71	42,11	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,58
909	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990778973	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,42	81,98	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,92
910	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990778997	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	55,47	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,09
911	Rivastigminum	Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990779000	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,53	108,14	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	69,40
912	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990768202	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	18,63	22,16	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,32
913	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990768264	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,56	40,79	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	31,10
914	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990768288	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	56,16	66,06	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	46,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
915	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990768301	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	42,12	50,04	20,76	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	35,51
916	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990768332	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	84,24	97,84	41,51	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	68,78
917	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990768363	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	56,16	66,06	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	46,68
918	Rivastigminum	Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990768370	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	112,32	129,30	55,35	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	90,56
919	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990886258	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	11,56	14,60	6,92	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,76
920	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990886296	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	23,11	28,54	13,84	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,85
921	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990886302	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,33	55,54	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,16
922	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990886364	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	34,67	42,06	20,76	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,53
923	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990886371	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	69,34	81,89	41,51	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,83
924	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990886401	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	46,22	55,43	27,68	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,05
925	Rivastigminum	Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990886425	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	95,80	111,64	55,35	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	72,90
926	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803156	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	11,51	14,56	6,92	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,72
927	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. (blis.)	5909990803545	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer	22,68	28,08	13,84	Choroba Alzheimer	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
928	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps. (blist.)	5909990803569	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	45,36	54,50	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	35,12
929	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (blist.)	5909990803781	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,56	41,95	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,42
930	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (blist.)	5909990803804	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,12	81,66	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,60
931	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (blist.)	5909990804085	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	45,36	54,50	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	35,12
932	Rivastigminum	Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (blist.)	5909990804108	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	91,80	107,35	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	68,61
933	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps.	5909990866250	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	18,63	22,16	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	17,32
934	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps.	5909990866304	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	32,23	38,31	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	28,62
935	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990866366	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	65,67	76,23	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	56,85
936	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps.	5909990866397	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	36,44	43,95	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	29,42
937	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990866427	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	71,51	84,22	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	55,16
938	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps.	5909990866458	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	43,74	52,76	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	33,38
939	Rivastigminum	Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990866472	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	86,51	101,69	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	62,95
940	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795307	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	11,57	14,61	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
941	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	28 kaps. twardych	5909990795376	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	23,13	28,56	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,87
942	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg	56 kaps.	5909990795383	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	55,47	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,09
943	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. twardych	5909990795567	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,70	42,10	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,57
944	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps.	5909990795574	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,40	81,96	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,90
945	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. twardych	5909990795598	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	46,27	55,47	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	36,09
946	Rivastigminum	Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps.	5909990795604	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	92,53	108,14	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	69,40
947	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860883	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	34,56	41,95	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	27,42
948	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860890	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	69,12	81,66	41,51	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	52,60
949	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	28 kaps. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860937	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	45,36	54,50	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	35,12
950	Rivastigminum	Signelon, kaps. twarde, 6 mg	56 kaps. (4 blist.po 14 szt.)	5909990860944	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	90,72	106,19	55,35	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	67,45
951	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg	28 tabl.	5909990808199	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	14,23	17,46	6,92	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	12,62
952	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 3 mg	28 tabl.	5909990808397	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	14,23	19,04	13,84	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	9,35
953	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg	28 tabl.	5909990808427	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	22,32	28,85	20,76	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	14,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
954	Rivastigminum	Symelon, kaps. twarde, 6 mg	28 tabl.	5909990808441	2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera	29,81	37,87	27,68	Choroba Alzheimera	Ot pienie w przebiegu choroby Lewy'ego	30%	18,49
955	Salbutamolom	Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml	100 ml	5909990317516	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego	3,00	4,49	4,49	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	3,20
956	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 20 mg	28 tabl.	5909990673742	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,94	13,81	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,05
957	Simvastatinum	Angiolip, tabl. powl., 40 mg	28 tabl.	5909990673759	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,76	26,20	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,68
958	Simvastatinum	Apo-Simva 10, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618279	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,01	9,41	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,25
959	Simvastatinum	Apo-Simva 20, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618286	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,80	15,99	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,67
960	Simvastatinum	Apo-Simva 40, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990618293	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,36	29,25	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	12,62
961	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023608	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,32	10,68	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,80
962	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990023646	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,85	21,20	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	13,44
963	Simvastatinum	Egilipid, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990023653	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,81	39,11	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	23,59
964	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649532	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,86	10,52	10,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,16
965	Simvastatinum	Simcovas, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990649655	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,25	20,32	20,32	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,10
966	Simvastatinum	Simgal, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46.0, Leki wpływające na gospodark lipidow - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,23	13,80	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
967	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860319	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,74	21,08	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,32
968	Simvastatinum	Simgal, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990860418	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	30,78	38,00	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	22,48
969	Simvastatinum	Simratio 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019723	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	10,77	13,31	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,43
970	Simvastatinum	Simratio 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	16,20	20,51	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,75
971	Simvastatinum	Simratio 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991019945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	38,58	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	23,06
972	Simvastatinum	Simvacard 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940110	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,18	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,30
973	Simvastatinum	Simvacard 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940219	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,55	19,82	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,06
974	Simvastatinum	Simvacard 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990940318	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	27,00	33,96	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,44
975	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941025	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	7,56	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,68
976	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,18	12,99	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,23
977	Simvastatinum	Simvachol, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990941223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	23,56	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,04
978	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336623	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,40	9,83	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,67
979	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990336630	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,39	17,70	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
980	Simvastatinum	Simvacor, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990675227	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	20,52	27,28	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,65
981	Simvastatinum	Simvagama 10, tabl. powł., 10 mg	30 tabl.	5909991146016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,10	6,30	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	2,14
982	Simvastatinum	Simvagama 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909991146115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	12,04	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,72
983	Simvastatinum	Simvagama 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909991146214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,39	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,76
984	Simvastatinum	Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743575	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	3,63	5,66	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	1,78
985	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037940	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,23	13,25	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,93
986	Simvastatinum	Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743650	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	7,24	10,93	10,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,28
987	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990037964	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,93	26,65	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,02
988	Simvastatinum	Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743667	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	21,24	21,24	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,37
989	Simvastatinum	SimvaHEXAL 10, tabl. powł., 0,01 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623273	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	8,10	10,59	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,43
990	Simvastatinum	SimvaHEXAL 20, tabl. powł., 0,02 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623297	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	21,85	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,53
991	Simvastatinum	SimvaHEXAL 40, tabl. powł., 0,04 g	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623334	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	25,92	33,06	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,43
992	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,40	7,69	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
993	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623105	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,83	13,88	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,56
994	Simvastatinum	Simvalip, tabl. powł., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990623136	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,82	24,39	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,76
995	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990037698	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,48	10,11	10,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,03
996	Simvastatinum	Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg	30 tabl.	5909990037704	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	6,70	10,54	10,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,16
997	Simvastatinum	Simvastatin 40, tabl. powł., 40 mg	30 tabl.	5909990037582	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	14,58	20,92	20,92	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	6,28
998	Simvastatinum	Simvasterol, tabl. powł., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	13,50	16,23	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	12,35
999	Simvastatinum	Simvasterol, tabl. powł., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990927715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	17,28	21,67	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,91
1000	Simvastatinum	Simvasterol, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990927838	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,32	38,58	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	23,06
1001	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990436316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,18	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,30
1002	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990436415	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,35	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,59
1003	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 10 mg	28 tabl.	5909990914012	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,72	12,18	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,30
1004	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 20 mg	28 tabl.	5909990914111	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	15,12	19,35	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	11,59
1005	Simvastatinum	Vasilip, tabl. powł., 40 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990982714	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	22,46	29,10	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1006	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,15	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,27
1007	Simvastatinum	Vastan, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909991073213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	12,10	16,13	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	8,37
1008	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990055722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,34	15,30	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,54
1009	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 10 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	5,94	8,27	5,94	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	4,11
1010	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 20 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	11,77	15,96	11,88	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	7,64
1011	Simvastatinum	Ximve, tabl. powl., 40 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990935314	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,44	26,12	23,76	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	9,49
1012	Simvastatinum	Zifam 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736621	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	4,80	6,92	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	3,04
1013	Simvastatinum	Zifam 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736638	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	9,54	13,38	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	5,62
1014	Simvastatinum	Zifam 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (pojem.)	5909990736645	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,38	25,80	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	10,28
1015	Simvastatinum	Zocor 10, tabl. powl., 10 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990365913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	22,68	5,54	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	18,80
1016	Simvastatinum	Zocor 20, tabl. powl., 20 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990366026	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	19,53	24,07	11,09	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	16,31
1017	Simvastatinum	Zocor 40, tabl. powl., 40 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990769124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	31,86	39,15	22,17	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	23,63
1018	Simvastatinum	Zocor 80, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990846627	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA	71,38	84,23	44,35	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia	30%	53,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1019	Sirolimusum	Rapamune, roztwór doustny , 1 mg/ml	60 ml (but.+30 strzyk.)	5909990893645	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	986,50	1 094,05	1 090,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	6,75
1020	Sirolimusum	Rapamune, tabl. powl., 1 mg	30 tabl.	5909990985210	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	135.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus	485,76	545,25	545,25	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek	ryczałt	3,20
1021	Sotalolum	Biosotal 160, tabl. , 160 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	13,91	17,72	10,90	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,09
1022	Sotalolum	Biosotal 40, tabl. , 40 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990365715	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,58	9,67	5,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,86
1023	Sotalolum	Biosotal 80, tabl. , 80 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990365616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,27	9,33	5,45	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,52
1024	Sotalolum	SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	12,96	15,92	7,26	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,84
1025	Sotalolum	SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991014711	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	2,43	3,12	1,82	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	1,85
1026	Sotalolum	SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990309016	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego	7,02	8,54	3,63	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia	30%	6,00
1027	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990110216	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	4,81	6,21	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	3,72
1028	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 25 mg	100 tabl.	5909990110223	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	17,82	23,23	17,81	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	10,76
1029	Spironolactonum	Spironol, tabl. , 100 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990673124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	9,93	14,25	14,25	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	4,28
1030	Spironolactonum	Verospiron, tabl. , 25 mg	20 tabl.	5909990117215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	5,89	7,36	3,56	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	4,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1031	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 50 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488414	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	10,90	14,56	10,69	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,08
1032	Spironolactonum	Verospiron, kaps. twarde, 100 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990488513	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton	16,38	22,22	21,38	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia	30%	7,25
1033	Sucralfatum	Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml	250 ml	5909990164615	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.2, Leki dziaaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - plynne postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,74
1034	Sucralfatum	Ulgastran, tabl. , 1 g	50 tabl.	5909990223619	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki dziaaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne	10,89	15,48	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	7,74
1035	Sucralfatum	Venter, tabl. powl., 1 g	50 tabl.	5909990242818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	3.1, Leki dziaaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne	15,57	20,50	15,48	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci	50%	12,76
1036	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml	100 ml	5909990312610	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne	9,80	13,85	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,39
1037	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml ml	100 ml	5909997198927	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne	9,72	13,77	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	7,31
1038	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 g/5ml	100 ml	5909990117819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne	8,93	12,93	12,93	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	6,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1039	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol 120, tabl. , 100+20 mg	20 tabl. (blist.)	5909990117529	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	8,64	10,86	5,23	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	8,25
1040	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol 480, tabl. , 400+80 mg	20 tabl.	5909990117611	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	10,46
1041	Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum	Biseptol 960, tabl. , 800+160 mg	10 tabl. (blist.)	5909990117710	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe	15,12	20,91	20,91	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego	50%	10,46
1042	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990864416	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	25,92	34,14	30,91	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	6,43
1043	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990864423	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	49,68	62,87	61,81	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	4,26
1044	Sulfasalazinum	Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909997012001	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	44,82	57,67	57,67	Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	3,20
1045	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	50 tabl.	5909990283316	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	27,15	35,46	30,91	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	7,75
1046	Sulfasalazinum	Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg	100 tabl.	5909990283323	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	48,69	61,81	61,81	Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1047	Sulfasalazinum	Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg	50 tabl.	5909990283217	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego	23,05	31,06	30,91	Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego	1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci	ryczałt	3,35
1048	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990051052	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	100,20	119,53	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	36,35
1049	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990051076	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	172,75	172,75	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1050	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990051137	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	995,16	1 096,87	863,75	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	236,32
1051	Tacrolimusum	Advagraf, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 3 mg	30 kaps.	5909990699957	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	592,73	658,45	518,25	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	143,40
1052	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990783489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	8,76
1053	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990783533	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	729,00	812,08	812,08	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kośćczy, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1054	Tacrolimusum	Cidimus, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990783571	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	166,55	166,55	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1055	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	172,75	172,75	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1056	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990447312	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	743,64	827,74	827,74	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1057	Tacrolimusum	Prograf, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909991148713	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	74,41	91,94	86,38	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	8,76
1058	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps.	5909990821006	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	66,96	83,97	83,97	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1059	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps.	5909990821228	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	146,20	172,75	172,75	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1060	Tacrolimusum	Tacni, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps.	5909990821280	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	669,60	748,53	748,53	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1061	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg	30 kaps.	5909990881352	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	68,85	85,99	85,99	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1062	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	30 kaps.	5909990881406	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	140,40	166,55	166,55	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1063	Tacrolimusum	Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg	90 kaps.	5909990881475	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	421,20	474,92	474,92	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1064	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836857	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	59,40	75,88	75,88	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20
1065	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 1 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836888	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	112,32	136,50	136,50	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek; Miastenia i zespoły miasteniczne, neuropatie zapalne, miopatie zapalne	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1066	Tacrolimusum	Taliximun, kaps. twarde, 5 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990836949	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01/2012-09-01 – dla kolumny 13	2 lata	139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus	540,00	609,85	609,85	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	Stan po przeszczepie narządu unaczynionego b d szpiku	ryczałt	3,20
1067	Telmisartanum	Micardis, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990440726	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	40,48	47,15	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	36,27
1068	Telmisartanum	Micardis, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990440818	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,18	31,86	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	20,98
1069	Telmisartanum	Micardis, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990440825	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	54,02	63,81	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	42,04
1070	Telmisartanum	Pritor, tabl., 40 mg	28 tabl.	5909990463428	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,43	54,59	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	43,71
1071	Telmisartanum	Pritor, tabl., 80 mg	14 tabl.	5909990463510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	32,70	38,83	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	27,95
1072	Telmisartanum	Pritor, tabl., 80 mg	28 tabl.	5909990463527	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	56,16	66,10	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	44,33
1073	Testosteronum	Undestor Testocaps, kaps., 40 mg	60 kaps. (6 blist.po 10 szt.)	5909990665082	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-11-01 – dla kolumny 13	2 lata	63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron	34,56	45,03	45,03	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Opóźnione dojrzewanie płciowe przy hipogonadzie mieszkowej - terapia substytucyjna	30%	13,51
1074	Theophyllinum	Euphyllin CR retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 250 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990665419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	5,94	8,12	5,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	5,34
1075	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450114	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	7,02	8,92	4,78	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,34
1076	Theophyllinum	Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990450213	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	9,18	11,90	7,18	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	7,92
1077	Theophyllinum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłużonym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl.	5909990261215	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu	8,23	11,96	11,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku życia	ryczałt	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1078	Theophyllum	Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990803910	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	6,31	8,51	5,98	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	5,73
1079	Theophyllum	Theovent 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg	50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)	5909990149926	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu	8,51	12,26	11,96	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia	ryczałt	4,30
1080	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 5 mg	50 tabl.	5909990058822	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	79,03	97,29	97,29	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1081	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 10 mg	50 tabl.	5909990058839	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	163,57	191,75	191,75	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1082	Tiagabinum	Gabitril, tabl. powł., 15 mg	50 tabl.	5909990058846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne	248,35	284,58	284,58	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1083	Ticlopudinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	60 tabl. (3 blist.po 20 szt.)	5909990334971	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	31,32	41,04	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	12,31
1084	Ticlopudinum	Aclostin, tabl. powł., 0,25 g	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990667116	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	16,20	21,07	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,49
1085	Ticlopudinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (but.)	5909990646616	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	27,27	36,71	36,71	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,01
1086	Ticlopudinum	Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg	30 tabl. (but.)	5909990938315	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	18,76	24,92	20,52	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	10,56
1087	Ticlopudinum	Iclopid, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990044986	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	29,70	39,31	39,31	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,79
1088	Ticlopudinum	Iclopid, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909991029333	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	11,45	15,98	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	6,40
1089	Ticlopudinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990694846	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	32,18	41,96	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,23
1090	Ticlopudinum	Ifapidin, tabl. powł., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990694853	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	16,63	21,52	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	11,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1091	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990450510	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	17,82	22,81	13,68	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	13,23
1092	Ticlopidinum	Ticlo, tabl. powl., 250 mg	60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)	5909990450534	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	23.2. Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna	37,80	47,97	41,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych	30%	19,24
1093	Tizanidinum	Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg	30 kaps. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671410	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	144.0. Leki dziaajace rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna	44,24	55,16	44,58	Stwardnienie rozsiane	Stany spastyczne ci zwi zane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci	30%	23,95
1094	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017652	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,98	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,81
1095	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990017669	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,07	25,07	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1096	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990017676	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,23	43,23	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1097	Topiramatum	Epiramat, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990017751	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,40	77,40	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1098	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990649556	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,68	15,03	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,86
1099	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990649570	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,70	26,74	26,74	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1100	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990649594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,46	41,31	41,31	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1101	Topiramatum	Epitoram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990649617	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,99	77,98	77,98	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1102	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644117	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,56	15,97	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,80
1103	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644148	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	20,52	27,62	26,74	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1104	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644155	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	41,47	53,08	53,08	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1105	Topiramatum	Erudan, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990644162	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	81,65	100,09	100,09	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1106	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990061464	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	83,16	101,70	101,70	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1107	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990061471	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	22,68	29,93	26,74	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,39
1108	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990061488	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,34	15,74	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,57
1109	Topiramatum	Etopro, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990061495	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	44,28	56,10	53,48	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,82
1110	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 25 mg	1 but. po 60szt.	5909990715084	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	16,20	23,22	23,22	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1111	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 50 mg	1 but. po 60szt.	5909990715145	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	30,24	41,37	41,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1112	Topiramatum	Oritop, tabl. powl., 100 mg	1 but. po 60szt.	5909990715169	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	56,70	73,69	73,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1113	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 200 mg	28 tabl.	5909990644056	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	60,45	77,40	77,40	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1114	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 100 mg	28 tabl.	5909990644070	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	32,26	43,23	43,23	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1115	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 50 mg	28 tabl.	5909990644094	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	18,14	25,07	25,07	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1116	Topiramatum	Symtopiram, tabl. powl., 25 mg	28 tabl.	5909990644124	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	10,63	14,98	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1117	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (but.)	5909990758814	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	11,72	16,15	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,98
1118	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (but.)	5909990758913	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	23,44	30,74	26,74	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,20
1119	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (but.)	5909990759019	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	46,87	58,87	53,48	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	8,59
1120	Topiramatum	Topamax, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (but.)	5909990759118	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	93,64	112,91	106,96	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	9,15
1121	Topiramatum	Topamax, kaps., 15 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861514	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	15,67	20,98	17,19	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	6,99
1122	Topiramatum	Topamax, kaps., 25 mg	60 kaps. (poj.)	5909990861613	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	26,13	33,85	28,65	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	8,40
1123	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 25 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743377	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	10,63	14,98	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,81
1124	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 50 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743384	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	18,14	25,07	25,07	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1125	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 100 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743391	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	32,26	43,23	43,23	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1126	Topiramatum	Topigen, tabl. powl., 200 miligram	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990743407	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	60,45	77,40	77,40	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1127	Topiramatum	TopiLEK 100, tabl. powl., 0,1 g	28 tabl. (but.)	5909990740802	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	25,92	36,45	36,45	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1128	Topiramatum	TopiLEK 200, tabl. powl., 0,2 g	28 tabl. (but.)	5909990740819	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	51,84	68,19	68,19	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1129	Topiramatum	TopiLEK 25, tabl. powl., 0,025 g	28 tabl. (but.)	5909990740789	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum	6,48	10,54	10,54	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1130	Topiramatum	TopiLEK 50, tabl. powl., 0,05 g	28 tabl. (but.)	5909990740796	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	19,53	19,53	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1131	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 25 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676545	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,85	17,36	13,37	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,19
1132	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 50 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990676552	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	23,54	30,85	26,74	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	7,31
1133	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 100 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676569	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	43,18	54,92	53,48	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,64
1134	Topiramatum	Topimatil, tabl. powl., 200 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990676576	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	80,46	98,80	98,80	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1135	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	60 tabl.	5909990744978	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	19,76	19,76	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1136	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	60 tabl.	5909990744985	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	36,75	36,75	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1137	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	60 tabl.	5909990744992	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	68,49	68,49	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1138	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	60 tabl.	5909990745005	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	103,68	127,95	127,95	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	4,27
1139	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 200 mg	30 tabl.	5909990763344	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	51,84	68,49	68,49	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1140	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 50 mg	30 tabl.	5909990763351	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	12,96	19,76	19,76	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1141	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 100 mg	30 tabl.	5909990763368	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	25,92	36,75	36,75	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1142	Topiramatum	Topiran, tabl. powl., 25 mg	30 tabl.	5909990763375	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	6,48	10,69	10,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1143	Topiramatum	Toramat, tabl. , 25 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671472	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	11,88	16,47	14,33	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	5,34
1144	Topiramatum	Toramat, tabl. , 50 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671489	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	19,44	26,69	26,69	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1145	Topiramatum	Toramat, tabl. , 100 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671496	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	34,56	46,00	46,00	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1146	Topiramatum	Toramat, tabl. , 200 mg	30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)	5909990671502	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat	64,80	82,35	82,35	Padaczka oporna na leczenie	Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia	ryczałt	3,20
1147	Valganciclovirum	Valcyte, tabl. powl., 450 mg	60 tabl. (but.)	5909990727407	2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13	2 lata	116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postaci do stosowania doustnego	5 562,00	6 054,23	6 054,23	Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narz dów mi szowych - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacji do 110 dni po przeszczepie, Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacji do 200 dni po przeszczepie	Zapobieganie i leczenie zaka enia wirusem cytomegalii po transplantacji narz dów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku ycia; Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom ko czyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zako czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacji do 110 dni po przeszczepie	ryczałt	3,20
1148	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,08 g	28 tabl.	5909990830961	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,58	16,23	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,35
1149	Valsartanum	Axudan, tabl. powl., 0,16 g	28 tabl.	5909990831067	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,76	31,44	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,67
1150	Valsartanum	Bespres, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751594	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	11,88	16,55	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	5,67
1151	Valsartanum	Bespres, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990751877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	23,50	31,17	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,40
1152	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 80 mg	28 tabl.	5909990929115	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one	43,20	50,07	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	39,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1153	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 160 mg	28 tabl.	5909990929214	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	46,44	55,70	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	33,93
1154	Valsartanum	Diovan, tabl. powl., 160 mg	14 tabl.	5909990929238	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	29,26	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	18,38
1155	Valsartanum	Nortivan, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726776	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	13,82	18,63	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	7,75
1156	Valsartanum	Nortivan, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)	5909990726844	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	26,46	34,32	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	12,55
1157	Valsartanum	Tensart, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990681877	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	14,82	19,71	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,83
1158	Valsartanum	Tensart, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990682065	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	30,15	38,27	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	16,50
1159	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074969	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,44	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	9,67
1160	Valsartanum	Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg	60 tabl.	5909990818983	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	47,52	60,36	60,36	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	18,11
1161	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990074945	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	17,28	22,33	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	11,45
1162	Valsartanum	Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg	60 tabl.	5909990818853	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	25,16	33,19	33,19	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	9,96
1163	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 80 mg	28 kaps.	5909990856954	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	10,80	15,40	15,40	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	4,62
1164	Valsartanum	Valsargen, kaps. twarde, 160 mg	28 kaps.	5909990857081	2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	21,60	29,12	29,12	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	8,74
1165	Valsartanum	Valzek, tabl. , 80 mg	28 tabl.	5909990681761	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	11,88	16,55	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia	30%	5,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1166	Valsartanum	Valzek, tabl. , 160 mg	28 tabl.	5909990681785	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	23,76	31,44	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	9,67
1167	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powl., 80 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688531	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	27,76	33,54	15,55	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	22,66
1168	Valsartanum	Zelvartan, tabl. powl., 160 mg	28 tabl. (4 blist.po 7 szt.)	5909990688722	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13	2 lata	45.0, Anatononi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone	28,84	36,87	31,10	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia	30%	15,10
1169	Verapamilum	Staveran 120, tabl. powl., 120 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045419	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	3,11	3,11	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	3,11
1170	Verapamilum	Staveran 40, tabl. powl., 40 mg	20 tabl. (1 blist.po 20 szt.)	5909990045211	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	2,52	1,04	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,52
1171	Verapamilum	Staveran 80, tabl. powl., 80 mg	20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)	5909990045310	2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13	2 lata	42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil	2,08	2,82	2,07	We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji	W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon)	ryczałt	2,82