

## LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY (ICD-10 G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, G 24.8, G 24.4)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
<p><b>1. Kryteria kwalifikacji</b>            1) komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej:            a) w kręczy karku u świadczeniobiorców poniżej 50 roku życia - badanie TK/MRI głowy, RTG kręgosłupa szyjnego, badanie poziomu miedzi lub ceruloplazminy, ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej,            b) w kurczu powiek - w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni),            c) w połowicznym kurczu twarzy - badanie TK lub MRI głowy;            2) wykluczenie miastenii i zespołu miastenicznego na podstawie wywiadu i badania neurologicznego (wykonanie dodatkowych badań jedynie w uzasadnionych przypadkach);            3) brak objawów uogólnionego zakażenia;            4) wykluczenie obecności stanu zapalnego w obrębie planowanego miejsca podania;            5) wykluczenie ciąży na podstawie wywiadu.</p> <p><b>2. Określenie czasu leczenia w programie</b>            Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p><b>3. Kryteria wyłączenia</b>            1) nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku;            2) powstanie oporności na lek;            3) stwierdzenie miastenii lub zespołu miastenicznego;            4) objawy uogólnionego zakażenia;            5) zapalenie okolicy miejsca podania;            6) ciąża;            7) przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową (np.</p>	<p><b>1. Dawkowanie</b>  <b>1.1 Botulinum A toxin a 500j. (Dysport)</b>            Kręcz karku 500 - 1.000 j.m.            Kurcz powiek 100 - 250 j.m.            Połowiczy kurcz twarzy 50 - 125 j.m.            Dystonia krtaniowa 40 - 80 j.m.            Dystonia twarzy 100-400 j.m.</p> <p><b>1.2 Botulinum A toxin a 100j. (Botox)</b>            Kręcz karku 100-200 j.m.            Kurcz powiek 20 - 50 j.m.            Połowiczy kurcz twarzy 10 - 25 j.m.            Dystonia krtaniowa 10 - 20 j.m.            Dystonia twarzy 20-80 j.m.</p> <p><b>1.3 Botulinum A toxin a 100j. (Xeomin)</b>            Kręcz karku 100 - 200 j.m.            Kurcz powiek 20 - 50 j.m.</p> <p>Częstość podawania leku zależy od stanu klinicznego świadczeniobiorcy, maksymalnie 4 razy w okresie roku.</p>	<p><b>1. Badania przy kwalifikacji</b>            1) morfologia krwi z rozmazem;            2) poziom miedzi;            3) poziom ceruloplazminy;            4) RTG kręgosłupa szyjnego;            5) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.</p> <p>RTG kręgosłupa szyjnego - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku.            Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku lub połowicznym kurczem twarzy.</p> <p><b>2. Monitorowanie leczenia</b>            EMG - badanie przeprowadzane w niektórych przypadkach zgodnie z harmonogramem dawkowania (w niektórych przypadkach uzasadniony jest wybór miejsca podania toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG).</p>

aminoglikozydy).		
------------------	--	--